

1867



Beobachtungen
über
achen- und Kehlkopf-Croup
in der Greifswalder Poliklinik.

naugural-Dissertation

zur
Erlangung der medicinischen Doctorwürde,
welche nebst beigelegten Thesen
mit
Bestimmung der hohen medicinischen Facultät der Universität
Greifswald
am 2. December 1867
öffentlich vertheidigen wird
Leopold Zielke
aus Posen.

Opponenten:

E. v. Czarliński Dr. med.
J. Jankowski cand. med.
A. Taesler Dr. phil. et med.

POSEN,
gedruckt bei L. Merzbach.

1867.

Seinen Hochgeehrten

Gönnern und Freunden

Hochachtungsvoll gewidmet

vom

Verfasser.

Cap. I.

Ueber die Natur von Croup und Diphtherie.

Trotzdem seit dem Erscheinen des Werkes Bre-
onneau's ¹⁾ in den zwanziger Jahren unseres Jahrhun-
derts sehr viele und werthvolle Werke geschrieben, und
zahlreiche exacte Untersuchungen über die acuten Rachen-
und Kehlkopfkrankheiten gemacht worden sind, so ist
noch die Wissenschaft über diese Affectionen noch nicht
zum Abschluss gekommen: es haben sich im Gegen-
theil im letzten Jahrzehnt über die Natur von Croup
und Diphtherie verschiedene Ansichten ausgebildet, de-
nen jede tüchtige Vertreter und genaue Forschungen
aufzuweisen hat, deren ich hier zum Theil Erwähnung
thun will.

Die wiener Schule nannte beide Erkrankungen crou-
ps ²⁾, während in Frankreich nach der Lehre von Bre-
onneau und seines Schülers Trousseau beide für diph-
theritisch erklärt wurden.

¹⁾ Recherches sur l'inflammation du tissu muqueux et en par-
ticulier sur la diphtherite etc. 1826 Paris.

²⁾ Berliner klinische Wochenschrift. Jrg 1865. N. 2. S. 16.

Eine andere Anschauungsweise, welche beide Prozesse streng auseinander hielt, vertrat Dr. Lewin in einem Aufsatz in der berliner Wochenschrift ¹⁾, indem er behauptet und den Beweis führt, „dass Croup und Diphtheretis zwei wesentlich von einander unterschiedene Krankheitsprozesse sind,“ welche Ansicht auch Prof. Ebert vertheidigt, und in einem besonderen Aufsätze ausspricht ²⁾.

Die dritte Ansicht habe ich in der Abhandlung Dr. Bartels „über die häutige Bräune“ ³⁾ gefunden, auf dessen sehr genaue Beobachtungen ich noch später zurückkommen werde. Er führt den Beweis, dass beide Prozesse identisch seien, und fasst seine Behauptung in der Weise zusammen ⁴⁾: „. . . Vielmehr bin ich . . . zu der Ueberzeugung gelangt, dass alle von mir beobachteten Fälle von idiopathischer Schleimhautentzündung mit crouphäutigen Auflagerungen, mögen sich die specifischen anatomischen Veränderungen auf die Schlingwerkzeuge oder auf die Luftwege beschränkt, oder beide zugleich befallen haben, als durch einen identischen Process angefacht betrachtet werden müssen.“ Er lässt auch keinen Unterschied zwischen epidemischem und sporadischem „Rachen- und Kehlkopf-Croup.“ zu ⁵⁾.

Ueber die Anschauungsweise der wiener Schule kann

¹⁾ Berl. klin. Wochschr. Jrg 1864. N. 3 „über Diphtheritis mit besonderer Berücksichtigung laryngoscopischer Erfahrungen.“

²⁾ ibidem Jrg. 64. N. 1.

³⁾ Archiv für klinische Medicin. Jg. 1866 Göttingen XX.

⁴⁾ ibidem XX. S. 378 seqq.

⁵⁾ cfr Archiv. f. klin. Med. 66. XX. S. 374 seqq.

ich mich einerseits desshalb hier nicht auslassen, weil es die Grenzen meiner Abhandlung überschreiten möchte, andererseits weil mir die dazu erforderlichen Quellen nicht zur Einsicht vorgelegen haben.

Es wird Niemand einfallen die Verdienste der französischen Schule, welche sich dieselbe in Bezug auf Croup und Diphtherie erworben, bestreiten zu wollen, und mit Recht wird anerkannt ¹⁾, dass Bretonneau nicht nur die Geschichte der Angina maligna der Vergessenheit enthoben, sondern auch die Lehre von den gerinnstoffig-exudativen Entzündungsformen der Schleimhaut begründet hat. Seine Lehre wurde von neueren französischen Forschern theils erweitert, theils begründet und Trousseau ist zu dem Resultate gelangt: dass es zwei Arten von Diphtheritis gebe, eine, so zusagen, gutartige, und eine maligne. Die erstere kann, vom Rachen ausgehend, auf den Kehlkopf und die angrenzenden Theile übergehn und hat eine rein locale Bedeutung, — diese Form schliesst die Affection des Kehlkopfs unter dem Namen Croup ein, indem die Unterscheidung beider nur mehr anatomisches Interesse darbiete; — die andere Form, welche er Diphtheritis maligna bezeichnet, kommt gewöhnlich nur epidemisch vor, und unterscheidet sich von der ersten Form dadurch, dass sie eine Art constitutioneller, auf das Blut einwirkender Krankheit darbiete ²⁾.

Dieser Lehre würde auch Traube's Ansicht, die bei

¹⁾ A. Hirsch, hist.-geographische Pathologie. Bd. II. 113 seqq.

²⁾ Trousseau-Culmann. Medicinische Klinik des Hôtel-Dieu in Paris. Bd. I. S. 353 seqq.

Mittheilung eines Falles von Diphtheritis aus seiner Klinik durch Dr. Fischer ¹⁾ ausgesprochen wird, das Wort reden. Es heisst dort:

a) „Die eine, von geringem Fieber und überhaupt von geringem Allgemeinleiden begleitet, wird nur dadurch gefährlich, dass sie, auf den Larynx übergehend, den Tod durch Erstickung herbeiführen kann...

b) „Anders verhält es sich mit der zweiten Form, welche man als typhoide bezeichnen kann, und die von Anfang an mit heftigem Fieber, tiefem Ergriffensein des Nervensystem einhergeht. Hier kann der Tod sowohl durch Suffocation, als durch Syncope erfolgen.“

Ebenso spricht sich für diese Ansicht Dr. Pauli aus in seiner Monographie „über den wahren Croup“ ²⁾, indem er denselben in der Weise definirt:

„Croup ist eine auf Rachenhöhle und Larynx und die benachbarten Luftwege beschränkte, dem kindlichen Alter von 2—8 Jahren besonders eigenthümliche locale Diphtheritis, dem primären Schanker analog. Wie letzterer zur allgemeinen Syphilis führen kann, so vermag auch die Laryngitis diphtheritica in allgemeine Diphtherie überzugehen, mit dem Unterschiede jedoch, dass ihre Contagiosität vorzugsweise bei epidemischer Verbreitung sich zu entwickeln pflegt....“

Die genannten Anschauungsweisen, so wie alle anderen, die aufzuweisen ein eigenes Volumen umfassen

¹⁾ Berl. klin. Wochschrft. 64. N. 1.

²⁾ Der wahre Croup, über die Erkenntniss und Behandlung desselben. Würzburg 1865. S. 176.

würde, weichen desswegen so weit auseinander, weil sie von verschiedenen Gesichtspunkten ausgehen, nämlich die einen vom klinischen, die andern vom anatomischen Standpunkte.

Virchow hat sich zu verschiedenen Zeiten verschiedentlich über Croup und Diphtheritis ausgesprochen, doch weist er neuerdings darauf hin ¹⁾, dass: wiewohl er auch jetzt noch die Trennung beider Begriffe für gerechtfertigt erklärt, er es anderseits für zweckmässig und nothwendig hält den Namen „Croup“ beizubehalten, und zwar ihn nicht sowohl auf eine anatomische als vielmehr auf eine klinische Krankheitsform anzuwenden, von der man anatomisch mehrere Arten unterscheiden kann, die auch der Kliniker in ihrer Bedeutung anerkennt.

Auch Bamberger, der diese Krankheit vom klinischen Standpunkte genau beobachtete, hat sich für dieselbe Ansicht erklärt. Er sagt ²⁾:

„So sind Croup und Diphtheritis weder vom anatomischen noch vom klinischen Standpunkte streng abgegrenzte, sich ausschliessende Individualitäten, sondern mit grösster Wahrscheinlichkeit als durch verschiedenartige, uns unbekannte innere und äussere Verhältnisse bedingte Gradeunterschiede desselben Prozesses anzusehn. Eine chemische Verschiedenheit in den Produkten dieser Exudationsform ist uns zur Zeit noch gänzlich unbekannt, äusseres Ansehen, Farbe, Consistenz

¹⁾ Berl. klin. Wochenschrft. 1865. N. 2.

²⁾ Virchow's Handbuch der Pathol. und Therap. 1855.

derselben können um so weniger ein unterscheidendes Merkmal abgeben, als sie für beide innerhalb gewisser, einander nicht ausschliessender Grenzen schwankend sind.“

Da nun die anatomischen Beobachtungen uns noch sehr im Dunkeln lassen über die eigentlichen Vorgänge und Veränderungen in beiden Prozessen, ferner, nach Ansicht der meisten pathologischen Anatomen oft und so sehr in einandergreifen, dass sie von einander kaum zu unterscheiden sind, da mich endlich bei meinen Beobachtungen mehr das klinische Interesse leitet, indem ich aus den sporadischen Fällen so wie der letzten Epidemie nur klinische Erfahrungen zu schöpfen im Stande war, so will ich, Virchow's Ansicht gern folgend, bei dieser meiner Arbeit, den letzteren Gesichtspunkt hauptsächlich im Auge behalten.

Cap. II.

Zur Geschichte der epidemischen Bräune.

Es sind in neuerer Zeit in Bezug auf geschichtliche Forschung so tüchtige Arbeiten nicht nur von französischen, sondern auch von deutschen und englischen Epidemiologen erschienen, dass es schwer wäre, in dieser Beziehung noch etwas neues zu bringen und daher nur auf Arbeiten eines Bretonneau ¹⁾ Deslandes, Rilliet

¹⁾ Des inflamm. speciales etc. s. oben.

und Barthez, Hirsch ¹⁾, Häser, Eisenmann ²⁾, Maingault ³⁾, Jaffé ⁴⁾, Pauli ⁵⁾ und anderer verwiesen zu werden braucht. Doch will ich, um ein besseres Verständniss unser Epidemie einzuleiten, wenigstens einen kurzen Ueberblick über sämmtliche Epidemien geben.

Bretonneau will die Diphtherie schon in den Werken der ältesten Schriftsteller erwähnt gefunden haben, als bei Araeteus ⁶⁾, der der Krankheit den damals üblichen Namen „*malum aegyptiacum*“ beilegt. Nach seiner Beschreibung scheint sie jedoch einen mehr pestartigen Charakter gehabt zu haben. Ferner erwähnt er noch Macrobius, der i. J. 380 (n. Chr.) eine Epidemie von Diphtherie in Rom beschrieben haben soll, und andere ältere Schriftsteller.

Sichere Anhaltspunkte finden wir erst Ende des 16. und Anfang des 17. Jahrhunderts, wo eine verheerende diphtherische Epidemie den südlichen und südwestlichen Theil Europa's schwer heimsuchte. — Drei spanische Aerzte: Villa-Real, Fontecha und Herrera haben uns recht genaue Beschreibungen hinterlassen, in denen sie die Krankheit mit dem volksthümlichen Namen

¹⁾ Handbuch der historisch-geographischen Pathologie. 1862 bis 1864. B. II.

²⁾ Die Ursache der diphtheritischen Lähmungen. Deutsche Klin. 1861. 17.

³⁾ P. A. Maingault: De la Paralysie diphtherique, recherches cliniques sur les causes, la nature et le traitement de cette affection. Paris 1860. VIII 162 p.

⁴⁾ Schmidt's Jahrbücher. Jhrg. 1862. 113. 119.

⁵⁾ „Der wahre Croup,“ Erkenntniss und Behandlung desselben. Würzburg 1865.

⁶⁾ Araetei Cappadoc. Lib. I. Cap. IX

„Garotilla“ (eigentlich Stäbchen, dessen sich der Henker zum Zusammendrehen des Strickes beim Erhängen bediente¹⁾ bezeichnen, und genau einer Gaumen und Rachen auskleidenden weisslichen Membran erwähnen²⁾).

Die letzte Erwähnung des epidemischen Croups im Mittelalter finden wir nach Jaffé³⁾ bei Alaymus⁴⁾ und Carnevale, welche die in den JJ. 1612—19 in Unteritalien und Sicilien herrschende Epidemie beschrieben. Sie nannten die Krankheit [ebenfalls volksthümlich: „male de canna“ und „morbus strangulatorius“⁵⁾], und erwähnen besonders der Ausbreitung der Membranen auf die Luftwege. Im 18. Jahrhundert werden die Mittheilungen über Angina-Epidemien häufiger. So beschreibt 1748 Fothergill eine Epidemie von Ang. diphtheritica in London und Umgebung⁶⁾, Ghizi zu derselben Zeit eine sehr bösartige Epidemie in Cremona, welche durch Ausbreitung auf Trachea und Bronchien am 3. bis 7. Tage den Tod herbeiführte, Malouin und Chomel beschreiben eine ähnliche Epidemie in Paris in den JJ. 1745—48. — Diesen Epidemien folgten sehr zahlreiche in Frankreich, England, Italien, Deutschland, Schweden, Nordamerika und selbst noch in den anderen Erdthei-

¹⁾ s. Hirsch Handb. B. II. S. 133. Anm. 3.

²⁾ Joannis de Villa-Real de signis, causis, essentia, prognosticae et curatione morbi suffocantis. Compluti, 1611.

³⁾ Schmidt's Jahrb. s. ob.

⁴⁾ Consultatio pro ulceris syriaci nunc vagantis curatione. Panhormi 1632.

⁵⁾ Carnevale de epidemico strangulationis affectu.

⁶⁾ Account of sore throat with ulcers. London 1748.

n, deren Aufzählung und Beschreibung in den betreffenden historisch-geographischen Pathologien zu finden ist.

Die zahlreichen Epidemien, über welche von Frankreich und England aus in unserem Jahrhundert berichtet wird aufzuzählen, würde mich zu weit führen, und indem ich nur noch erwähne, dass gerade die Beschreibungen dieser Epidemien es sind, welche uns ein Licht über die Natur der Krankheit, die bis dahin vollkommen im Dunkel geschwebt, werfen, will ich noch von deutschen Schriftstellern im 19. Jahrhundert beschriebenen Epidemien zusammenstellen¹⁾.

Im Jahre 1801 wurde von Elsner in Ostpreussen und von Märker in Marienwerder und den nördlich davon gelegenen Ortschaften eine Croup-Epidemie beobachtet. In demselben Jahre in Hamburg von Dr. Wiand vom October — December,

1804 in Altona im Herbst und Winter,

1805 in Würzburg Februar und Winter (sic!),

1807 in Tübingen, Kirchheim und anderen Orten
Würtembergs — Frühling und Herbst,

1807—8 Ratzeburg (December — April), Wien
(December — März),

1812 Baireuth (Januar und Februar),

1824 Salzburg (November und December),

1834 Tuttlingen (Januar — April), ausserdem noch andere bis zum Jahre 1845 in der Rheinprovinz, Gmaringen, Schweiz, Sachsen, Ostpreussen, und eine in Reifswald (1845, beschrieben von Stubenrauch).

¹⁾ Hirsch. Hist.-geogr. H. B. II. S. 120 sqq.

Seit dem Jahre 1847 sind noch folgende Epidemien beschrieben, die jedoch einen mehr diphtheritischen Charakter zeigten:

1847 in Hadamar (Nassau),

1849—50 Königsberg (Westpr.),

1853 wieder in Hadamar,

1854 in mehren Gemeinden des Cantons Zürich.

1856—58 wieder in Königsberg, ferner hat Dr. Bartels 1855 in Dähnischen-wohld (bei Kiel) und 1857 in Kiel selbst Epidemien beobachtet, welche letztere bis in die neueste Zeit (1865) hin sich erstreckt und allmählig gesteigert hat. Dr. Veit hat 1862 in der Nähe von Berlin eine Epidemie beobachtet und seinerzeit darüber berichtet¹⁾, endlich wurde noch die in Ostfriesland in den JJ. 1861 und 62 herrschende Epidemie von Dr. Köhnemann beobachtet und beschrieben.

Vier der zuletzt genannten Beschreibungen liegen mir vor. a) Die in Greifswald im J. 1845 von Stubenrauch, b) die in Kiel von Bartels, c) von Köhnemann in Ostfriesland und d) die bei Berlin von Veit beobachteten Epidemien. Ich kann nicht umhin, dieselben näher ins Auge zu fassen, um den Verlauf dieser Epidemien mit der von mir beobachteten gleichsam zu vergleichen und zu erhellen, ob vielleicht durch meine Beobachtungen etwas für die Lehre von den croupösen Affectionen Neues oder Berichtigendes entspringe.

Da jedoch die Gabe der Beobachtung nur mit Jahren und durch wiederholte Forschungen geschärft und

¹⁾ Deutsche Klin. 1862. 52.

übt wird, so mögen mir Männer von Fach, welche in Wissen gross geworden, vergeben, wenn ich vielleicht nur das Alte, Bekannte bestätigen zu können im Stande sein werde, und mögen diese Erstlingsgeburt meines wissenschaftlichen Strebens, wenn nicht als einen Stein zum Bau unserer medicinischen Wissenschaft, so doch als Cement für die Befestigung mehrerer schon gelegten Steine der Forschung ansehen! —

Cap. III.

Kurze Zusammenstellung der in den vier genannten Epidemien gemachten Erfahrungen.

Da von diesen vier Epidemien mich die greifswalder¹⁾ am meisten interessirt, so will ich mit dieser anfangen, zumal sie unter den genannten auch chronologisch den ersten Platz behauptet.

Stubenrauch fand, dass die von ihm beobachteten Group-Fälle von zahlreichen Katarrhen der Brustorgane, Pneumonien, Bronchitiden, rheumatischen Affectionen, vorzüglich aber vom Keuchhusten antecedit waren. Er nennt dies „constitutio catarrhalis“, quae praevalente, ut observationes docent, modo catarrhum merum, modo tussim convulsivam, modo anginam membranaceam in conspectum venire; quo magna horum affinitas probatur.

¹⁾ Diss. inaug. De ang. membr. epidemica annis 1844/45 Gryphiae observata.

Es ist dies ein Umstand, den auch Veit bei Beschreibung seiner Epidemie in den Verhandlungen der berl. med. Gesellschaft¹⁾ hervorhebt, indem er gleichsam mit Nachdruck erwähnt, „dass Scarlatina der vor ihm beobachteten Epidemie vorhergegangen sei“. Auch er nimmt die Hypothese an, „dass die diphtheritische (epidemische) Angina unter ungünstigen, uns unbekannten Bedingungen als eine Steigerung der katarrhalisch-entzündlichen Bräune angesehen werden muss, und dass nachdem einmal sich die Diphtheritis entwickelt hat, diese sich durch Contagium weiter ausbreiten kann.

Ueber den Einfluss der Witterung und Jahreszeit schreibt Stubenrauch ein Breites und erwähnt doch nicht genauer, wie es sich mit den Temperaturverhältnissen während seiner Epidemie verhielt, was meiner Ansicht nach immerhin wichtig genug gewesen wäre. — Koehneman spricht über diesen Punkt²⁾:

„Den Einfluss der Witterung, kalter Ostwinde und Nebel auf die Krankheit habe ich in grossem Umfange erfahren, und mit einer Bestimmtheit, dass es mir mehrfach gelungen ist die Exacerbation der Epidemie vorher zu verkünden.“

Dass die Disposition vorzüglich bei Kindern bestehe, ergeben die statistischen Tabellen dieser Epidemien. Dass ferner solche, die schon einmal diese Krankheit durchgemacht haben, oder bei denen eine zu

¹⁾ Deutsche Klinik 1862. N. 52.

²⁾ Ueber Diphtheritis deren Geschichte, Verlauf, Behandlung und Vorbauung. Hannover 1862. l. c. 43 seqq.

atarrhen neigende oder scrophulöse Constitution be-
ehe, ganz besonders zu croupösen Affectionen disponi-
n, darin kommen die mir vorliegenden Beschreibungen
n überein.

Stubenrauch meint beobachtet zu haben, dass Kna-
n öfter befallen würden, als Mädchen. Doch begreife
n nicht, woraus St. diesen Schluss gezogen hat. Er
ebt zuerst 14 Krankengeschichten von eigentlichem
roup; die Patienten waren: 8 Mädchen, 6 Knaben.
achher beschreibt er noch 2 Fälle von Diphtherie in
r Stadt, den einen von einem 14jährigen Knaben,
n anderen von einem 15jährigen Mädchen, endlich
wähnt er noch dreier Fälle von Diphtherie, die in
nem benachbarten Dorfe stattgehabt haben, davon
a Knabe und 2 Mädchen. Die überwiegende Anzahl
r Patienten sind sonach Mädchen und zwar 11 gegen
Knaben. —

Ueber klimatische-und Bodenverhältnisse glaubt
ohnemann die Beobachtung gemacht zu haben, „dass
Diphtheritis (epidemische Croup) in morastigen Ge-
nden, auf dem Sande und in der Marsch ¹⁾, ja selbst
den Inseln, wo die Luft stets von frischem Seewinde
reinigt wird, gleich vorkomme.“

Ueber den Einfluss der materiellen Verhältnisse
Kranken auf Ausbreitung der Krankheit können
ar die wenigen von Stubenrauch in der Poliklinik
gestellten Beobachtungen nicht maassgebend sein.
er auch die anderen Beobachtungen stimmen darin

¹⁾ l. c. S. 44.

überein, dass allerdings äussere Verhältnisse von einigem Einfluss auf den epidemischen Croup seien, dass feuchte, kalte, dumpfige Wohnungen und miasmatische Ausdünstungen ihn zu fördern scheinen. Andererseits haben jedoch Studien der neueren Epidemien gegentheilige Resultate ergeben.

Ueber das endemische Vorkommen des epidemischen Croups sind in neuerer Zeit genauere Beobachtungen gemacht worden. — So giebt Veit an, dass in der nächsten Nachbarschaft des von der Croupepidemie schwer heimgesuchten Ortes ein Dorf lag, welches weder topographische noch materielle Vorthelle vor dem ersteren voraus hatte, und doch sei dort nicht ein einziger Fall von Diphtheritis beobachtet worden.

Köhnemann giebt ebenfalls an, „dass es bei der Epidemie in Baltrum auffallend war, dass die Krankheit nur in dem sogenannten Westdorfe herrschte, während das Ostdorf, kaum eine Viertelstunde von dem ersteren entfernt, gänzlich verschont blieb. — Sehr genaue Beobachtungen darüber hatte Bartels angestellt. — Schon im J. 1855 beobachtete er eine Epidemie in Dähnischewohld (b. Kiel), welche hartnäckig an dem Orte haftend alljährig gleichsam ihre Opfer holte. Er beobachtete sogar einzelne Häuser in der Ortschaft, welche, trotzdem dass sie durchaus keinen Nachtheil gegen die anderen zu haben schienen, bei Auftreten der Krankheit lange und hart heimgesucht wurden, während andere ganz davon verschont blieben.

Dass der epidemische Croup sowohl direkt als indirekt contagiös sei, darin kommen auch die 4 Beobachter

st überein. Für diese Ansicht hat sich Veit ausgesprochen, wie aus seinen (S. 17. Z. 7 seqq.) citirten Worten ersichtlich; diese Erfahrung hat Köhnemann gemacht, und glaubt „bestimmt der Ansicht derjenigen citireten zu müssen, die die Contagiosität der Diphtherie anerkennen.“ — Bartels dagegen glaubt, dass der (epidemische) Croup nicht wie Exantheme durch directes Contagium übertragen werde, obgleich er selbst die gegentheilige Erfahrung gemacht hat, und einige exquisite Fälle von direkter Ansteckung mittheilt; vielmehr behauptet er, „sei der direkten Contagiosität nur untergeordnete Rolle zuzuschreiben ¹⁾.“

Stubenrauch beschreibt, wie schon erwähnt, in seiner Dissertation 19 Fälle, davon 14 Fälle von eigentlichem Croup, welche sporadisch in dem Zeitraume vom 1. Juli 1844 bis zum Anfang Juni 1845 verliefen. Schon im Februar 1845 zeigte sich dazwischen ein Fall an Diphtherie an einem 14jährigen Knaben, welcher tödtlich endete. Im Juni desselben Jahres kam ein ähnlicher Fall an einem 15jährigen Mädchen vor, der jedoch, bei weitem weniger bösartig, in Genesung überging. St. erkennt einen Unterschied an zwischen den 14 zuerst und den beiden zuletzt beschriebenen Fällen, und fügt hinzu, dass in derselben Zeit den beiden letzten ähnliche Fälle in einem nahen Dorfe vorgekommen seien. Den Schluss, den er sich aus den letzteren, in Form von den beschriebenen Croupfällen

¹⁾ Deutsches Archiv für klinische Medicin J. 1866. Göttingen. N. 1. c. S. 370 seqq.

ganz verschiedenen Krankheitsbildern gemacht, beschränkt er leider nur auf die Worte: „*affatim (mihi hae observationes) probant, quam late tunc Anginae membranaceae epidemia fuerit pervagata* ¹⁾.“

Die von Veit mitgetheilte Epidemie herrschte im Sommer und Herbst d. J. 1862 in einem Dorfe unweit Berlin. In dem, 230 Einwohner in 22 Häusern vertheilt zählenden Orte kamen 39 Erkrankungen und 17 Todesfälle vor. Mit Ausnahme von fünf erwachsenen Mädchen (v. 16—18 J.) waren die Erkrankten durchgehends Kinder. Von den 22 Häusern wurden 7 verschont. Der Tod erfolgte durch Kräfte-Consumption — am 2. — 3. — 8. Tage, nur in einem Falle erst am 16. Tage.

Köhneman theilt den statistischen Bericht von fünf Orten in Ostfriesland mit. In Esens, Norden mit Umgegend und Hage währte sie über ein Jahr, und das Sterblichkeitsverhältniss hat 20% betragen. In Norderney, wo sie nur von October 61 bis April 62 hauste, betrug die Zahl der Erkrankungen 68, der Todesfälle 13 (also nur 19, 1%); ähnlich ist das Sterblichkeitsverhältniss aus der Epidemie auf der Insel Baltrum, wo auf 149 Ew. in einer Zeit von 5 Monaten 19 starben.

Aus den Mittheilungen des Dr. Bartels sehen wir die Endemicität bewiesen und die mehre Jahre in zunehmendem Maasse sporadisch auftretenden Fälle sich allmählig zu einer Epidemie gestalten, welche, wie gewöhnlich solche langsam auftretenden Seuchen, nie so

¹⁾ l. c. p. 37.

erdrückend wird als plötzlich auftretende. Das Mortalitätsverhältniss soll nach B's. Angaben auf der Halbinsel vom J. 1862—65 von 0,32 auf 0,17% gestiegen sein. B. beobachtete im Laufe der Epidemie verschiedene Fälle, theils solche wo die Exudation sich bloss auf Rachen und Gaumen beschränkte, — und solcher Fälle will er 4 mit tödtlichem Ausgange bemerkt haben, — ferner solche, die sich bloss auf den unteren Theil des Larynx und die Trachea ausbreiteten, drittens auch solche, wo sich der Prozess entweder bloss auf den Larynx oder auf Pharynx und Larynx beschränkte. Dieses letztere soll besonders oft eingetreten sein; unter 18 in der kieler Klinik vom Januar 62 bis December 65 an croupösen Affectionen Behandelten, soll bei 56 Patienten die Betheiligung des Larynx beobachtet worden sein. — In pathologisch-anatomischer Hinsicht sollen jedoch alle diese Fälle gleich gewesen sein; so die Beschaffenheit der Membranen, ihr mikroskopischer Befund, so die darunter befindliche Schleimhaut, welche unter der Pseudomembran überall unversehrt und geröthet, zuweilen blass, öfter durch Capillarinjection oder punktförmige Extravasate mehr oder weniger stark geröthet erschien ¹⁾. Auch Lähmungserscheinungen hat er in fünf Fällen als Nachkrankheiten des epidemischen Croup's beobachtet.

In pathologisch-anatomischer Beziehung lernen wir aus den Beobachtungen B's. sehr viel. Es stand ihm ein sehr reichliches Material zu Gebote, woran er den

¹⁾ cfr. S. 374 seqq.

klinischen Studien dieser Krankheit noch genaue Forschungen am Sectionstisch folgen lassen konnte, und diesem Umstande verdanken wir es, dass B. in einem Punkte namentlich, der bis dahin nur hypothetisch da stand, ich meine die Ansicht: „wodurch der Tod in dieser Krankheit herbeigeführt werde,“ fast bestimmte Resultate erzielte. — Es ist bekannt, dass man den Tod beim Croup der Erstickung zuschrieb, während der bei der Diphtherie der Blutvergiftung Schuld gegeben wurde. — Wenn man auch vorläufig das zweite zugeben wird, so bleibt doch die Erklärung des ersten, selbst wenn man, wie viele der Beobachter, den Glottiskrampf zu Hilfe nimmt, lückenhaft, namentlich in den Fällen, wo nach erfolgter Tracheotomie, selbst wenn in den feinsten Bronchien keine Exudatpfropfe nachzuweisen sind, der Tod unter den Erscheinungen der langsamen Erstickung eintritt. — Diesem Grund hat Bartels vor allem am Krankenbette sowohl als am Sektionstisch nachgeforscht, und ist zu dem Resultate gekommen ¹⁾, „dass in den betreffenden Fällen schon vor dem Tode die Ungleichheit in der Vertheilung von Blut und Luft innerhalb der Lungen soweit gediehen sein musste, dass die Luft fast ausschliesslich in die vorderen, das Blut vorzüglich durch die hinteren Lungentheile strömte. Diese Theilung der Lunge in Luft- und Blut-führende Abschnitte scheiner mir die eigentliche Ursache der Erstickung auch nach Anlegung der Trachealfistel zu sein.“ Demnach wäre die Ursache des Todes der Umstand, dass die in die vordere Lungenparthie eingeströmte Luft

¹⁾ l. c. S. 408 seqq.

auf den Athmungsprocess wirkungslos bleibe, indem sie nur zum kleinen Theil in Kontakt komme mit der auf die hinteren Lungenparthien vertheilte Blutmenge. Den Nachweis dieser Schlussfolgerung durch Bestimmung des Sauerstoff-Gehalts der ausgeathmeten Luft zu geben, war B. leider durch Umstände verhindert.

Die Symptome unter denen die mir vorliegenden Epidemien auftraten, waren: in der greifswalder Ep. J. 1845 die des vorwaltenden Croups; in der ostpreussischen und der von Veit beobachteten hatten sie einen mehr typhoiden, septischen Charakter, verbunden mit Collapsus, Albuminurie und dgl.; in der von Bartels beobachteten war der Charakter ein gemischter, doch vorwaltend croupöser Natur.

Die Behandlung in den 4 Epidemien war eine zweifache. Bartels und Stubenrauch wandten vorzüglich den antiphlogistischen Apparat an, was bei den Fällen mit vorwaltend croupösem Charakter allerdings gerechtfertigt und erfolgreich schien, doch in dem Falle von wirklicher Diphtherie, welcher nach der Mittheilung von Stubenrauch mit 2maliger Venäsection, 12 Blutegeln und dgl. tractirt wurde, sich als ganz verkehrt bewies und als solcher rächte. — Die Behandlungsweise bei den von Veit und Koehnemann beschriebenen Epidemien war eine vorzugsweise tonisirende und antiseptische. —

Indem ich nun zur Beschreibung der von mir beobachteten Epidemie von Rachen- und Kehlkopf-Croup übergehe, habe ich mir zur Aufgabe gemacht, meine geehrten Leser nicht durch Mittheilungen von Krankengeschichten zu ermüden, sondern erst die allgemeinen,

sodann die speciellen Eigenschaften und Symptome unserer Epidemie mitzutheilen, und nur da, wo es durchaus nothwendig erscheinen sollte, ein kurzes Krankheitsbild zu entwerfen.

Da ich selbst nicht alle vorgekommenen Fälle beobachten konnte, sind mir, so weit sie vorhanden waren, durch Herrn Prof. Moslers Güte die Krankengeschichten und poliklinischen Jahrbücher zur Benutzung überwiesen worden; auch hat mir derselbe bei der Beobachtung und Behandlung dieser Krankheit, mit Rath und That beigestanden, wofür ich ihm hiermit meinen wärmsten Dank ausspreche! Herr Dr. Schirmer hatte während dieser Epidemie ebenfalls mehrere Fälle von Croup des Pharynx und Larynx in seiner Privatpraxis, und führte die beiden Tracheotomien in unser Poliklinik aus. Sowohl über seine Fälle, namentlich aber über die beiden Tracheotomien war er so gütig mir Näheres mitzutheilen, wofür ich auch ihm hiermit bestens zu danken nicht unterlassen kann.

Cap. IV.

Statistische Uebersicht des Croup mit besonderer Berücksichtigung der diesjährigen Epidemie.

Es ist durch historisch-geographische Forschungen erwiesen, dass die croupösen Rachen- und Kehlkopf Affectionen an den Küsten der Nord- und Ost-See reicher heimisch sind, und gerade hier gewöhnlich einen sehr

piden und bösartigen Verlauf nehmen ¹⁾ ²⁾. Wenn
er Croup in dieser Gegend sporadisch auch sonst
durchaus nicht selten vorkommt, so erweisen doch unsere
polyklinischen Jahrbücher, dass er in manchen Jahren
anz besonders häufig, bösartig auftritt. Schon im J.
1844/45 ist eine Epidemie von Croup mit nachfolgen-
der Diphtherie an unserem Orte beobachtet und, wie
oben bereits erwähnt, beschrieben worden. Ob die
Krankheit seit dieser Zeit sich nur sporadisch hier
aufgehalten, oder auch wieder epidemisch aufgetreten
ist, kann ich nicht genau bestimmen, da mir die poli-
klinischen Jahrbücher von a. 45 bis dato nicht zu Ge-
bote gestanden. Erst vom J. 1862 habe ich die Kehlkopf- und Rachen-Krankheiten statistisch verfolgen, und
mir aus denselben die folgenden Tabellen aufstellen
lassen. Ich habe, meiner Ansicht nach am besten
übersichtlich, zuerst die Gesamtzahl der acuten Ra-
chen- und Kehlkopf-Erkrankungen aufgestellt, sodann die
einzelnen Diagnosen der acuten Halsaffectionen, wie
sie in den Büchern gefunden, folgen lassen. —
Wenn hin und wieder vielleicht ein kleiner Error mit-
tergelaufen ist, so glaube ich dies auf die später an-
zuführenden Gründe schieben zu dürfen, da ich die
größte Pünktlichkeit und Sorgfalt bei Aufstellung die-
ser Tabellen beobachtet habe.

¹⁾ Niemeyers Handb. der Pathol. B. I.

²⁾ Hirsch, Handb. der hist.-geogr. Pathol. B. II.

Tab. I.

Jahr.	Gesamt- zahl der Halserkran- kungen.	Reiner Croup.	Rachen- Croup.	Rachencroup bei Scarlatina.	Pseudocroup.	Angina tons et catarrh.	Laryngitis.	Pharyngitis et Laryngits.	Angina phlegmonosa.
1862	46	3	0	3	2	27	9	1	1
1863	83	3	5	13	2	38	19	2	1
1864	151	28	10	2	3	67	24	15	2
1865	92	13	5	1	7	35	25	4	2
1866	132	23	8	2	4	51	18	9	8
1867	92	17	23	1	6	29	10	3	3
bis zum 12/9.									

Wir ersehen aus dieser ersten Tabelle, dass die Erkrankungen alle im Einklange eine zweimal zunehmende, einmal abnehmende Zahl zeigen. Die Gesamtzahl der Erkrankungen nimmt vom Januar 1862 bis zum December 1864 von 46 auf 151 Fälle zu; in demselben Verhältnisse die Croupfälle von 3 auf 38, die Pharyngitiden von 27 auf 67. Das J. 1865 lässt deutlich eine Remission merken, welche aber schon im folgenden Jahre wieder im Zunehmen begriffen ist und bereits bis zum 12. September 1867 die enorme Zahl von 40 Croupfällen erreicht hat. Bei der Betrachtung der seit dem Jahre 1862 von 3 auf 38 und bis zum 12. Septbr. 1867 wieder auf 40 Croupfälle angewachsenen Zahl glaube ich mich gerechtfertigt zu sehen, wenn ich die im Jahre 1864, vorzüglich aber die im Jahre 1867 beobachteten angehäuften Fälle als Epidemien betrachte. Da mir jedoch alle nähere Beschreibung über die Epidemie der im Jahre 1864 vorgekommenen

lle abgeht, so werde ich mich vorzüglich mit der
zteren beschäftigen.

§. 1. Aitiologie. — Einleitende Krankheiten.

Die Aitiologie der Epidemien allerzeit zu erforschen, haben sich viele und bedeutende Männer zur Aufgabe gemacht. Man hat — und zwar nicht mit Recht — vorhergehende Krankheiten in Zusammenhang mit Croup-Epidemien gebracht; man hat Jahreszeit, Luft und Bodenverhältnisse, Raum- und Lebensverhältnisse, ferner Alter, Geschlecht, Constitution, endlich ein Contagium dessen beschuldigt, doch ist es nicht gelungen, in allen diesen Punkten sichere Resultate zu erzielen, da in der einen Epidemie dieser, in der andern ein anderer Grund mehr hervorgetreten ist.

Wir wollen der Reihe nach diese Verhältnisse prüfen und sehen, wie sie sich bei uns geltend machen, und was wir daher aus der beobachteten Epidemie entnehmen können.

In den mir vorliegenden Epidemien war ¹⁾, wie bereits oben bemerkt, der Beeinflussung vorhergehender Krankheiten Erwähnung gethan. Auch ich habe vollen und diesen Behauptungen beizustimmen. Um dieses erklären diene Tab. II.

¹⁾ S. ob. S. 16. Cap. III.

Tab. II.

Jahr.	Januar, Februar, März.	April, Mai, Juni.	Juli, August, September.	October, November, December.
1862			Scharlach sporad.	
1863	Scharlach epidemisch.		Scharlach epidemisch.	
1864	Scharlach hört auf.	Rachencroup.	Tussis conv. tritt auf.	
1865	Tussis conv.	Morbillen. einzelne scarlat.....		etwas häufiger.
1866		Cholera. scarlatina.	Cholera. sporad. . .	seltener Tussis zunehmend.
1867	Typhus abdom. Croup. scarlatina	Rachen- u. Kehlkopfscrip. seltener.		zunehmend.

Aus dieser Tab. ersehen wir, dass etwa gegen Mitte des Jahres 1862 Scharlach sich in der Stadt zeigte, welcher das ganze Jahr 1863 hindurch bis zu Anfang 1864 herrschend, im Sommer 1863 seine Akme erreichte und in den ersten drei Monaten des Jahres 1864 erloschte. Ihm folgten einige vereinzelte Fälle von Rachencroup (Diphtheritis) und gegen Ende desselben Jahres trat Keuchhusten auf, welcher bis in die drei ersten Monate des Jahres 1865 sich hineinzog. Die Morbillenepidemie, welche am 5. Mai 1865 ihren ersten Fall zählte, nahm einen so reissenden Zuwachs und Verlauf, dass wir von diesem Datum ab bis zum 29. August 1865 bereits 391 Fälle zählten; darunter verliefen 35 Fälle mit tödtlichem Ausgange und von diesen wieder 10 Fälle wegen Complication mit Rachen- oder Kehlkopfscrip. Nach der Morbillenepidemie tritt ein

Zeitraum von beinahe $1\frac{1}{2}$ Monaten ein, welcher fast gar keine Halsaffection bringt. Doch schon während der Morbillenepidemie desselben Jahres zeigen sich vereinzelte Fälle von wiedereintretender Scarlatina, welche die drei letzten Monate des Jahres 1865, das ganze Jahr 1866, — gegen Ende desselben exacerbirend — und die ersten beiden Monate des Jahres 1867 hindurch dauert, aber nicht denselben böartigen Charakter zeigt, der sie im Jahre 1863 so gefährlich machte. Nebenbei (als gleichsam zu unserer Aufgabe nicht gehörend) muss ich noch erwähnen, dass im Winter 1866/67 und im Frühjahr 1867 Typhus abdominalis unsere Gegend heimsuchte. Daraus ersehen wir also, dass beide Epidemien, sowohl die von 64, als die diesjährige unmittelbar dem Scharlach sich anschliessen, ja sogar in die Scharlachepidemien hineinragen, als ob sie mit demselben ihren Ursprung nähmen.

§. 2. Jahreszeit; — Klima, — Temperatur.

Windrichtung. — Hygrometer. —

Das Klima hierselbst ist durch die unmittelbare Nähe der See stark beeinflusst; daher erklärt sich die grosse Unbeständigkeit des Wetters in allen Jahreszeiten. So wechseln mitten im Winter starke Fröste mit regnerischen eiskalten Tagen ab, während in den Sommermonaten auf einige heisse Tage ein Temperaturabfall auf $+ 8^{\circ}$ R. plötzlich einzutreten pflegt. Die Seewinde, namentlich Ost- und Nordostwinde, welche wegen der Flachheit des Landes hierselbst den freiesten Spielraum haben, bringen oft im Verein mit den besonders im Winter und dann im Juli und August häufigen

Nebeln in einer Tageszeit winterlichen Lufthauch, sommerliche Sonnenhitze und herbstlichen Sprühregen.

Es ist durch historisch-pathologische Forschungen ziemlich erwiesen, dass der sporadische Croup (Kehlkopfcroup) namentlich in kalter feuchter Jahreszeit auftritt, während der epidemische in jeder Jahreszeit zu gedeihen scheint. Es können natürlich meine statistischen Zusammenstellungen von 6 Jahren durchaus nicht massgebend sein; doch dürften sie den Einfluss der Jahreszeit auf die Bräune in Greifswald gerade etwas beleuchten.

Tab. III.

Jahr	Gesamterkrankungen.											
	Jan.	Febr.	März.	April	Mai.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Octbr.	Novbr.	Decbr.
1862	4	1	1	6	2	1	4	5	4	7	7	4
1863	5	4	6	3	5	8	11	9	3	5	10	14
1864	23	11	19	29	22	8	7	5	2	2	9	14
1865	9	12	12	13	5	4	9	5	1	5	5	12
1866	12	15	20	7	12	12	8	9	4	9	12	12
1867 bis 29. Sept.	6	10	13	9	18	6	10	12	8	0	0	0
	59	53	69	67	64	39	49	42	22	28	42	56

Tab. IV.

Jahr.	Rachen- und Kehlkopfcroup.											
	Jan.	Febr.	März.	April.	Mai.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Octbr.	Novbr.	Decbr.
1862	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	1	1
1863	0	1	3	0	1	4	3	0	0	1	3	5
1864	9	2	4	4	8	2	0	1	2	0	5	3
1865	3	3	2	1	1	2	3	0	0	2	0	2
1866	4	6	6	0	1	4	0	2	0	1	5	4
1867	3	1	6	5	13	0	3	6	6	0	0	0
	19	13	18	10	23	12	9	10	9	5	14	15

Ich bin durch Aufstellung der Tab. III. zu dem Resultate gekommen, dass es drei Zeiten giebt, welche gewöhnlich die meisten Fälle der Rachen- und Kehlkopfserkrankungen zählen. Es sind gleichsam die drei Höhepunkte der Ausbreitung der Krankheit:

a) October bis December, b) März bis April, c) Juni, d. i. in Mitten des Winters mit dem Uebergang des Winters zum Frühling, und während des Sommers selbst; doch glaube ich den dritten Zeitpunkt im Sommer der Epidemie allein Schuld zu geben, welche sich gerade weniger nach Witterungsverhältnissen kehrt. Ebenso scheint sich das Bild für die Bräune zu gestalten, wie Tab. IV. lehrt. Die beiden ersten Zeitpunkte haben auch auf den sporadischen Croup denselben Einfluss. Der dritte Zeitpunkt während des Sommers ist, wie deutlich zu ersehen, der Epidemie des laufenden Jahres allein eigen und wir bemerken bei specieller Betrachtung des Jahres 1867 auf Tab. IV., dass im Monat August und September noch eine zweite Zunahme der Croupfälle eintritt, nachdem Juni und Juli fast frei davon waren. Um einen strengeren Beweis zu führen, inwiefern die beiden genannten Jahreszeiten dem sporadischen Croup so günstig sind, sowie um näher zu erörtern, ob vielleicht durch Temperatur oder Windrichtung oder Feuchtigkeit der Luft unsere Epidemie befördert worden, bedurfte ich meteorologischer Beobachtungen. Da dieselben jedoch in Greifswald leider nicht angestellt werden, war Herr Prof. Frommer in Eldena so gütig, mir die von ihm angestellten Beobachtungen mitzutheilen, sowie sie Tab. V. enthält

Jahr.	Monate.	Temperatur bestimmt nach	
		Maximum.	Minimum.
1865	Januar.	+ 1,43°	— 2,18°
	Februar.	— 2,5°	— 6,18°
	Maerz.	+ 1,70°	— 2,29°
	April.	+ 6,56°	+ 2,57°
	Mai.	+ 17,66°	+ 8°
	Juni.	+ 13,66°	+ 6,9°
	Juli.	+ 19,3°	+ 11,2°
	August.	+ 15,58°	+ 9,29°
	September.	+ 15,6°	+ 7,2°
	October.	+ 9,4°	+ 3,5°
	November.	+ 6,1°	+ 2,8°
	December.	+ 2,97°	+ 1,30°
1866	Januar.	+ 3,93°	+ 1,74°
	Februar.	+ 4,25°	+ 1,7°
	Maerz.	+ 2,61°	— 1,09°
	April.	+ 9,20°	+ 3,37°
	Mai.	+ 10,2°	+ 3,8°
	Juni.	+ 17,27°	+ 9,20°
	Juli.	+ 17,13°	+ 9,15°
	August.	+ 16,61°	+ 8,70°
	September.	+ 16,77°	+ 8,60°
	October.	+ 6,87°	+ 2,20°
	November.	+ 4,06°	+ 2,16°
	December.	— 2,06°	— + 0°
1867	Januar.	+ 2°	— 3,7°
	Februar.	—	—
	Maerz.	+ 1,743°	— 2,935°
	April.	+ 6,1°	+ 3,°
	Mai.	+ 9,84°	+ 4,07°
	Juni.	+ 15,6°	+ 8,47°
	Juli.	+ 15,55°	+ 9,50°
	August.	+ 18°	+ 9,94°
	September.	+ 14,5°	+ 7,2°

V.

Wetteraumur. Mittlerer Durchschnitt.	Windrichtung.	Menge der Nieder- schläge, wie Regen, Thau etc. in Zollen (") u. Linien (").
— 0,37°	südwestl. und westl.	0
— 4,34°	östl., süd- und nordöstl.	0
— 1,14°	östl. und nordöstl.	0
+ 4,66°	östl. mit nord- und südöstl.	9,5"
+ 12,83°	südl. und westl.	10,5"
+ 10,28°	westl. und nordwestl.	2" 7"
+ 15,25°	westl. mit süd- und nordwestl.	12,5"
+ 12,43°	nordwestl.	4" 4,5"
+ 11,43°	westl. und nordwestl.	11"
+ 6,45°	westl. mit süd- und nordwestl.	14"
+ 4,45°	südl. und westl.	9"
+ 2,10°	westl.	8"
+ 2,83°	westl. und südwestl.	0
+ 2,98°	südwestl.	2" 9,5"
+ 1,30°	östl. und nordöstl.	8,5"
+ 6,29	nordöstl. und östl.	0
+ 7°	nordöstl. und nordwestl.	2"
+ 13,24°	westl. und nördl.	19"
+ 13,14°	südwestl. und westl.	25"
+ 12,66°	westl. mit süd- und nordwestl.	25"
+ 12,69°	südl. mit südwestl. u. südöstl.	22"
+ 4,53°	nördl. mit nordöstl. u. nordwestl.	13"
+ 3,11°	westl. besonders südwestl.	13,5"
+ 1,03°	südl. und südwestl.	0
+ 2,8°	südwestl.	0
—	—	—
— 1,468°	östl. und nordöstl.	0
+ 4,75°	nord- und südwestl.	3"
+ 6,96°	nördl. und nordöstl.	0
+ 12,04°	nordwestl.	30"
+ 12,52°	nordwestl.	3" 9"
+ 13,97°	süd- und nordwestl.	2" 8"
+ 10,85°	westl. mit nord- und südwestl.	

Aus den Allgemeinbetrachtungen des Jahres 1865 und 1866 ersehen wir, dass die Windrichtung allerdings von Einfluss zu sein scheint; der Beweis passt jedoch mehr auf die Monate März und April, während in den Wintermonaten mehr westliche und südwestliche Winde vorherrschen, dagegen der October gewöhnlich nördlichen und nordöstlichen Wind hat.

Die grösste Temperaturschwankung beobachteten wir ebenfalls auf der Scheidegrenze vom März zum April und vom September zum October. Im Jahre 1865 ist die Temperaturschwankung vom April zum Mai grösser.

Die Menge der Niederschläge sehen wir zu verschiedenen Monaten verschieden erscheinen. So war in diesen drei Jahren der Januar der trockenste Monat; im Jahre 1865 hatten November (9") und December (8") die grösste Menge von Niederschlägen; im Jahre 1866 erreicht die grösste Menge von Niederschlägen nur 2" 9''' (im Februar) und (im Mai) 2"; im laufenden Jahre herrschte im April (3") und Juli (3" 9''') die grösste Feuchtigkeit.

Der Vergleich dieser Verhältnisse mit der in Tab. III. und IV. angegebenen Anzahl von Erkrankungen erscheint hier nothwendig.

Im Jahre 1865 sehen wir die meisten Halsaffektionen im Februar (12), März (12), April (13), Juli (9) und December (12); die meisten Croupfälle im Januar (3), Februar (3) und Juli (3). Der Januar war trocken, -kalt mit südwestlicher und westlicher Windrichtung; im Februar hob sich die Kälte von (mittl.

Durchschnitt) $-0,37^{\circ}$ auf $-4,34^{\circ}$, indem der Wind mehr östliche und nordöstliche Richtung annahm. Temperatur, Hygrometer und Windrichtung hielt sich auch im März noch; daher sehen wir auch noch in diesem Monat eine wenig steigende Zahl von Erkrankungen. Im April wird die Windrichtung mehr südlich, die Temperatur steigt auf $+4,66^{\circ}$; daher sehen wir zwar noch zahlreiche Halsaffectionen auftreten, welche jedoch nur noch einen milden Charakter zu bieten scheinen, indem die Zahl der Croupfälle auf nur einen sinkt. Die beiden folgenden Monate Mai und Juni lassen die Affectionen ganz abnehmen, indem die Temperatur steigt und die Windrichtung vorwiegend südlich und westlich wird. Gegen Ende Juli und Anfang August tritt trotz der Wärme von 15° — 19° mehr nördliche Luftströmung ein und die Feuchtigkeit nimmt von $12,5'''$ auf $4,5'''$ zu. Dies steigert die Gesamtfälle auf 9 und die Croupfälle auf 3. Gegen Ende des Jahres fällt die Temperatur ganz allmählig ab; die Richtung des Windes bleibt mehr westlich und nur die Feuchtigkeit nimmt bedeutend (auf $9''$) zu. Diese Verhältnisse steigern wieder die Zahl der Erkrankungen auf die im Februar und März gehabte Höhe.

Die drei ersten Monate des J. 1866 bieten eine immer mehr fallende Temperatur im Januar und Februar bei südwestlicher, im März bei nördlicher und nordöstlicher Windrichtung. Daher sehen wir auch die Halsaffectionen an Zahl zunehmen von 12 auf 20 (März), die Croupfälle von 4 auf 6 (März). Die Feuchtigkeit scheint hierbei keine Rolle zu spielen. — Der

April zeigt bei vorwiegend nordöstlicher Luftströmung eine Temperaturzunahme von 5° und Trockenheit der Luft. Es nehmen daher die Gesammterkrankungsfälle von 20 auf 7 und die Croupfälle von 6 auf 0 ab, um gegen Ende des Juni bei nördlicher Windrichtung wieder auf 12 (Croupfälle auf 4) zuzunehmen. Auch in diesem Jahre zeigen die drei letzten Monate bei langsam abnehmender Temperatur und meist westlicher Windrichtung eine allmähliche Zunahme von Erkrankungen.

Vom Monat Februar des Jahres 1867 fehlen mir leider die Beobachtungen. Die Temperatur bleibt im Januar und März gleichmässig kalt und trocken. Der einzige Unterschied scheint nur in der Windrichtung zwischen dem Januar und März zu bestehen, indem der März östliche und nordöstliche Strömungen hatte. Daher ist auch die Zahl der Gesammterkrankungsfälle vom Januar bis März von 6 auf 13 und der Croupfälle von 3 auf 6 gestiegen. Der April, welcher eine Temperaturzunahme von 5° zeigt und mehr westliche Luftströmung hatte, bietet eine Abnahme der Fälle, während im Mai, welcher die meisten Fälle zählt, wieder nordöstliche und nördliche Windrichtung vorherrscht. In den folgenden Monaten zeigt die Temperatur keine abnormen Schwankungen; die Windrichtung bleibt durchweg nördlich d. h. mehr nordwestlich; die Feuchtigkeit nimmt zu. Daher sehen wir im Juni, welcher eine bedeutende Wärmezunahme zeigt (von 6° auf 12°) bei nordwestlichem Winde weniger Fälle vorkommen. In dem folgenden Monate tritt grössere Temperaturschwankung ein

it (süd- und) nordwestlicher Windrichtung und grösser Feuchtigkeit der Luft, welche insgemein mit dem im September auftretenden westlichen und nord- und nordwestlichen Winde die Exacerbation der diesjährigen Epidemie hervorrufen. Wir sehen vorwiegend in diesem Jahre die nördliche Windströmung vorherrschen, Temperatur und Feuchtigkeit dagegen keine abnormen Höhen erreichen.

Aus diesem Vergleich glaube ich im Allgemeinen zu ziehen zu haben:

1, dass die Temperatur und Windrichtung sowohl der Gemeinschaft, als Windrichtung vorzüglich allein einen bedeutenden Einfluss auf die Zunahme der Krankheit haben. Die Temperatur allein bei günstiger Windrichtung scheint wenig Einfluss zu haben, noch weniger die Feuchtigkeit der Luft allein;

2, dass an unserem Orte die croupösen Erkrankungen hauptsächlich in den Uebergangszeiten häufig vorkommen;

3, dass durch den Einfluss der Winde zu jeder Zeit Exacerbationen des Croup vorkommen;

4, (in Bezug auf unsere Epidemie), dass dieselbe vorzüglich durch die nördlichen in diesem Jahre vorherrschenden Luftströmungen unterhalten und genährt wurde.

§. 3. Boden- und Raumverhältnisse.

Ueber die Bodenverhältnisse Greifswalds und der Gegend giebt der amtliche Bericht vom Jahre 1864

welchen mir Herr Kreissekretair Wilken mittheile, folgendes an:

Der Boden bietet in seiner Beschaffenheit eine grosse Verschiedenheit dar, ist aber im Allgemeinen ein sicherer, warmer und tragbarer. Meist findet sich unter einer Ackerkrume von wechselnder Tiefe ein trockner, durchlassender, öfters mit Lehm gemischter Untergrund. Seltener Sand und fast nie Wasser.

Unsere Stadt und Umgegend wird im Allgemeinen für gesund gelegen gehalten, namentlich scheint sich dies bei der Cholera im vorigen Jahre ziemlich bewährt zu haben; denn, wie Prof. Dr. Mosler in seinem „Vorsichtsmassregeln wider die Cholera 1)“ ausdrücklich hervorhebt, es sind die Städte Uckermünde, Anclam, Stralsund, Pasewalk schwer von derselben heimgesucht gewesen, während unsere Universitätsstadt verhältnissmässig wenige Erkrankungen aufzuzählen hatte. Ich habe, um der Frage ob und in wiefern die Oertlichkeit auf unsere Krankheit von Einfluss ist, erst die Lage der Stadt und Vorstädte, sodann das Verhältniss der Gebäude zu der Einwohnerzahl zu untersuchen mir die Mühe gegeben, endlich habe ich aus den poliklinischen Jahrbüchern der letzten Jahre die Erkrankungen numerisch nach den einzelnen Stadttheilen zusammengestellt.

Für diejenigen meiner Leser, welche Greifswald und Umgegend nicht kennen, mögen folgende kleine Erläuterungen dienen.

1) Ein populärer Vortrag 1866. Scharff.

Die Stadt, früher eine Festung, ist von drei Seiten von dem sogenannten Stadtgraben umgeben, welcher bis jetzt stehendes, schlammiges Wasser enthielt und ungesunde Ausdünstungen nur förderte. Die Nordseite wird von dem Elusse Ryk, welcher ein sehr schwaches Gefälle hat, begrenzt. Die Hauptstrassen lassen in sanitärer Beziehung manches zu wünschen übrig, die Nebenstrassen vor allen Dingen in ihren Höfen gesündere Nebengebäude für die daselbst haufenweise bei einander wohnenden ärmeren Leute. Die Stadt ist ihrer natürlichen Lage nach einzutheilen in: das Innere der Stadt selbst, deren Umgrenzung der oben erwähnte Stadtgraben bildet und in die drei Vorstädte: die südwestliche, die südöstliche und die nördliche. Ich habe bei der Beobachtung dieser Eintheilung die Gützkowerstrasse als Grenze zwischen den beiden erst genannten Vorstädten angenommen und die Strassen, welche östlich von derselben liegen zur südöstlichen, während die Gützkowerstrasse selbst und die westlich von derselben liegenden Theile zum südwestlichen Stadttheil gerechnet. Ich habe die Anzahl der Häuser in der Stadt beträgtt 5 mit 12,282 Einwohnern; in den Vorstädten zusammen 445 Häuser mit 6439 Einwohnern und zwar kommen auf die nördliche Vorstadt 45 Häuser mit 481 Ew., auf die südöstliche 198 Häuser mit 2917 Ew., auf die südwestliche 202 Häuser mit 3041 Ew. — Welche Zahlen ich mir mit Benutzung amtlicher Berichte zusammengestellt habe.

Die geringe Anzahl der Erkrankungen in der nördlichen Vorstadt ist daher zu erklären, dass sie über-

haupt eine nur verhältnissmässig geringe Ausdehnung besitzt; ferner dass sie sehr wenig Proletariat beherbergt, welches doch fast allein für die Poliklinik das Contingent zu stellen pflegt.

Die beiden andern Vorstädte, die südöstliche und die südwestliche, bewohnen vorwiegend ärmere Leute als: Tagelöhner, Bahnarbeiter, niedere Beamte und dgl.; auch sind dieselben viel stärker bevölkert, als die nördliche. Zudem sind die meisten Gebäude in denselben namentlich aber in der südwestlichen Vorstadt seit einigen Jahren neu gebaut, neue Strassen auf nassem Boden — wie man sich deutlich davon beim Fundamentgraben überzeugen kann — angelegt; was natürlich für die Gesundheit von durchaus schädlichen Folgen sein muss, zumal für die Gesundheit der Kinder, deren merkwürdigerweise gerade die Vorstädte die grösste Zahl zu beherbergen scheinen.

Die Frage: welche von beiden Vorstädten wohl gerade am meisten für die Entwicklung unserer Krankheit geneigt war, hat mich hierbei am meisten beschäftigt und glaube ich darin zu einem gewissen Resultate gekommen zu sein. Zuvor muss ich jedoch erwähnen, dass die Cholera im verflossenen Jahre mehr in der südöstlichen Vorstadt Platz genommen hatte, und von der südwestlichen gerade eine Strasse, welche auch bei unserer Epidemie die meisten Fälle von Rachen-Bräune aufzuweisen hat, nämlich die Wilhelmstr. recht schwer heimgesucht wurde.

Tab. VI.
Gesammterkrankungen.

Jahr.	Stadt.	Südöstl. u. östl.	Südwestl. u. westl.	Nördl.	Um- gegend.
1862	27	9	9	0	1
1863	43	14	24	0	2
1864	71	43	33	1	3
1865	58	24	28	0	2
1866	64	27	31	2	8
1867	45	19	24	0	4

Tab. VII.
Croupkrankungen.

Jahr.	Stadt	Südöstl. u. östl.	Südwestl. u. westl.	Nördl.	Um- gegend.
1862	2	1	0	0	0
1863	10	1	9	0	1
1864	18	14	7	1	0
1865	5	9	5	0	0
1866	11	9	11	1	1
1867	14	9	18	0	0

Aus Tab. VI und VII ist zu ersehen, dass von den Jahren 1862 bis October 1867 in der Stadt die meisten Halsaffectionen vorgekommen sind; dies hat seinen Grund einerseits darin, dass die Bevölkerung der Stadt sehr aneinandergedrängt wohnt, theils darin, dass die Stadt noch einmal so viel Ew. zählt, als die Vorstädte zusammengenommen. In der Mehrzahl der genannten Halsaffectionen so wie der Croupfälle folgt dann die südwestliche Vorstadt. Während die Gesamtzahl der Erkrankungen in der Stadt sich auf 288, Croupfälle auf 60 beläuft, fielen in dem südwestlichen Theile 149 Gesammterkrankungen und 50 Fälle

von Croup vor, in der südöstlichen Vorstadt dagegen auf 136 Gesamtfälle nur 43 Fälle von Croup.

Wenn in der Stadt auf 12,282 Ew. in den 6 Jahren nur 60 Fälle von Croup vorgekommen sind, in den beiden Vorstädten zusammen in dieser Zeit aber 93 Fälle, trotzdem dass sie nur 5958 Ew. zählen, so sehen wir schon aus dieser oberflächlichen Betrachtung, ohne die Prozentzahl zu berechnen, dass die Disposition zu den Erkrankungen resp. dem Croup dort eine etwa 3 mal grössere ist. Die südwestliche Vorstadt überbietet darin noch die südöstliche.

Die letzten beiden statistischen Tabellen belehren uns aber noch über einen neuen Umstand, nämlich, dass die Disposition zu Zeiten mit dem Orte wechselt. Denn wir sehen bei der Epidemie im J. 1864 die Zahl der Halsaffectionen im südöstlichen Stadttheil plötzlich von 14 auf 43 und der Croupfälle von 1 auf 14 zunehmen, während im südwestlichen in derselben Zeit ein fallendes Verhältniss beobachtet wird; es nimmt dort die Zahl der Gesammterkrankungen nur von 24 auf 33 zu, die Zahl der Croupfälle sogar von 9 auf 7 ab. Die zweite, im J. 1867 beobachtete Epidemie dagegen zeigt wieder ein überwiegendes Verhältniss im südwestlichen Stadttheil.

Ueber die Lage der südöstlichen und südwestlichen Vorstadt muss ich noch erwähnen, dass sie, etwas tiefer liegend als die Stadt mit ihren hohen Wällen, gerade recht geschützt sein müssten vor Nord- und Nord-West-Winden.

Bei diesem Resultate muss ich jedoch noch einen Umstand erwähnen, den ich auch schon oben berührt habe, dass die Vorstädte die meiste Zahl des Proletariats beherbergen, daher auch dort gerade von unserer Klinik die meisten Fälle beobachtet sind.

§. 4. Endemicität — Materielle Verhältnisse.

Die Beobachtung unserer Epidemie hat in Bezug auf die Raumverhältnisse und den Einfluss von unreiner, schlechter Luft, und von Armuth und dürftigen Umständen folgende Resultate ergeben.

Ich habe sowohl im ersten Stadium der diesjährigen Epidemie, als im zweiten, von dem später die Rede sein wird, beobachtet, dass feuchte, schlechte Wohnungen, namentlich kleine Häuser in engen schmutzigen Gassen, ferner Familien, welche in 1—2 Stuben dicht zusammengedrängt wohnen, besonders von eitrigen Affectionen heimgesucht wurden. So ist in einem kleinen Hause (der Wilhelmstr.) in welchem etwa 4 Familien mit nahezu 12 Kindern wohnten, wo der Hof schmutzig und durch Schweinezucht verunreinigt war, fast die grösste Hälfte der Kinder an Rachencroup krank, ebenso sind die Fälle in der Stadt, welche gerade die bösartigsten waren, in einer der engsten und schmutzigsten Gassen (Rossmühlengasse) vorgekommen. — Auch die Ordnungsliebe, wie sie in den betreffenden Familien herrschte, könnte ich nicht als Musterhaft aufstellen. Andererseits jedoch habe ich in

einem Falle selbst beobachtet und aus H. Dr. Schirmers Privatpraxis erfahren, dass schwere Fälle von Croup vorgekommen sind in Familien, die durchaus gut, ja sogar zum Theil sehr gut situirt sind, die grösste Reinlichkeit, Sorgfalt und Pflege beobachtet haben, deren Wohnungen auch in dem gesündesten Stadttheile gelegen, gross, geräumig und gesund schienen, und keine andere Gelegenheitsursache für die Entstehung der Krankheit an Ort und Stelle nachzuweisen war.

§. 5. Disposition.

Dass die sogen. scrophulöse Constitution, ferner die schon einmal überstandene croupöse Affection oder andere chronische Halsübel eine ganz besondere Disposition namentlich für den Rachencroup darbieten, glaube ich mit einiger Bestimmtheit nachweisen zu können.

Die Kinder: Rosa, Fritz und Heinrich E. von 3, 5, 8 Jahren haben gegen Ende des vorigen Jahres die Scarlatina mit diphtheritischer Rachenentzündung überstanden, waren nachdem aber wieder ganz hergestellt worden. Gegen Ende des Monats Mai cr., wo die diesjährige Epidemie ihre erste Akme erreichte, erkrankte zuerst der älteste Knabe, dann das Mädchen und zuletzt der 5jährige Knabe an Rachencroup, und zwar in demselben Verhältniss der Intensität, als bei ihnen der Scharlach aufgetreten war. Der älteste Knabe starb, das Mädchen schwebte längere Zeit durch

hinzugetretene Bronchitis in Lebensgefahr, während das 3. Kind, sowohl vordem an Scharlach, als jetzt am Croup am wenigsten zu leiden hatte.

Ein anderer Fall zeigt uns ein Mädchen von 6 Jahren L. v. K. welches an chronischer angina tonsillaris litt. Es erkrankte mit Fieber und Heiserkeit eines Abends, die Tonsillen waren geschwollen, geröthet, auf der rechten weissgelbe Plaques zu sehen. Durch einmaliges Pinseln mit sol. arg. nitr (gr. X: Unc j), sowie durch Gurgeln mit Kali hypermangan. wich das Uebel nach 2—3 Tagen, ohne weitere Ausdehnung zu gewinnen.

Ein anderer Fall endlich, welcher auch noch in anderer Beziehung viel Interesse bietet, zeigt, wie die Anstrengung der Stimme durch vieles und lautes Sprechen sowie Erkältung die Diphtherie in bösartigster Form herbeiführte. Genauen Bericht über diesen Fall S. (65 seq.).

§. 6. Alter. — Geschlecht.

Wir kommen nun an einen viel und oft besprochenen Punkt bei unserer Krankheit, ich meine das Lebensalter und das Geschlecht. Dass das kindliche Alter ganz besonders zu der Krankheit disponirt und zwar besonders im Alter von 1—5 Jahren, ist eine ausgezeichnete Thatsache und bewährt sich auch durch meine Beobachtungen. Der vielfach noch streitige Punkt, ob das männliche oder das weibliche Geschlecht mehr dazu

inclinire, ist durch verschiedene Epidemien verschieden erwiesen. Um mit einer gewissen Genauigkeit zu verfahren, will ich zuerst die Gesammtzahl der Einwohner in die verschiedenen Altersstufen und Geschlechter classificiren. Nach der amtlichen Volkszählung von 1864 hatte Greifswald:

	männl.	weibl.
Kinder von unter 1 Jahr bis 1 Jahr	204	220
— — 1—5 Jahr	761	832
— — 5—10 Jahr	898	897
— — 10—15 Jahr	848	775
— — 15—20 Jahr	748	669
Erwachsene	5699	6170
Summa	9158	9568

Es überwiegt also die weibliche Bevölkerung die männliche um 305; die Zahl der Erwachsenen resp. über 20 Jahr alten Personen übertrifft die darunterstehenden um 5017.

Tab. VIII.

Gesammte Halseffektionen.

Jahr.	K i n d e r.								Er- wachsene	
	unter 1—1 Jahr.		1—5 Jahre.		5—10 Jahre.		10—20 Jahre.		männl.	weibl.
	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.		
1862	2	2	9	5	4	3	2	4	7	8
1863	2	2	6	7	6	5	4	6	12	12
1864	5	5	15	25	11	16	2	7	14	11
1865	2	1	11	18	2	7	18	10	16	7
1866	8	5	20	15	10	13	10	10	16	11
1867	5	3	22	21	8	8	6	5	9	5

Tab. IX.
Croupfälle.

Jahr.	K i n d e r.								Er- wachsene	
	unter 1—1 Jahr.		1—5 Jahre.		5—10 Jahre.		10—20 Jahre.		männl.	weibl.
	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.		
1862	1	0	4	0	0	1	0	0	0	0
1863	2	1	7	6	3	1	0	1	0	0
1864	4	4	9	10	6	5	1	1	0	0
1865	1	1	2	8	1	2	2	2	0	0
1866	2	2	11	7	2	5	2	1	0	1
1867	1	1	11	16	5	4	0	1	2	0

Tab. VIII giebt uns die Gesamtzahl der Halsaffektionen in den verschiedenen Altern und Geschlechtern an, während Tab. IX uns die Croupfälle in dieser Beziehung besonders beleuchtet.

Die oberflächliche Betrachtung beider Tabellen giebt uns eigenthümliche Resultate. Wir erfahren daraus, dass die Disposition zur Erkrankung bis zum ersten Jahre mehr bei den Knaben vorherrscht; in dem Alter von 1—10 Jahren mehr bei Mädchen. Zwischen dem 10.—20. Jahre scheint sich die Disposition mehr gleich zu bleiben, während sie bei dem höheren Alter wieder mehr auf Seiten des männlichen Geschlechts ist.

An Halsaffektionen im Allgemeinen erkrankten mehrere männlichen Geschlechts, indem auf 521 Gesamtterkrankungen 264 das männliche, 257 das weibliche Geschlecht betrafen. Umgekehrt ist es mit den Croupfällen. Hier kommen auf die Gesamtzahl von 60 Croupfällen 79 auf das männliche, 81 auf das

weibliche Geschlecht; doch erhalten wir beim Vergleich der beiden Epidemien von 64 und 67 noch ein anderes Resultat.

Wie wir oben erfahren, dass bei den Ortsverhältnissen zwischen der Epidemie von 1864 und der diesjährigen ein gewisser Unterschied besteht, so finden wir ihn auch noch zwischen beiden in Bezug auf das Geschlecht. Im Jahre 1864 nämlich erkrankten an acuten Halsaffektionen 47 Knaben, 64 Mädchen, worunter sich die Croupfälle auf beiden Seiten das Gleichgewicht von 20 Fällen hielten. Im Jahre 1867 dagegen erkrankten 50 männlichen und nur 42 weiblichen Geschlechts; von diesen 42 Mädchen jedoch waren merkwürdigerweise 22 von croupösen Affektionen befallen, während von den 50 männlichen Geschlechts nur 19 diese Form der Erkrankung darboten.

Die Mehrzahl der Fälle sowohl in den hier zusammengestellten Jahren als in den beiden Epidemien kommt vor in dem Alter von 1—5 Jahren. Die Gesamtzahl der Kinder dieses Alters beträgt 1593, die Gesamtzahl der Erkrankungsfälle von Halsaffektionen 174, der Croupfälle 91; es verhält sich somit die Zahl der Croupfälle zu der Zahl der Gesunden wie 1 : 17 etwa; dagegen die Zahl der gesammten Halsaffektionen zu der der Gesunden wie 1 : 9.

Nächst dem Alter von 1—5 Jahren hat die grösste Disposition zu Halsaffektionen das Alter von 5—10 J., dann das von 10—20 J., endlich die Kinder unter einem Jahre. Bei den croupösen Affektionen ist nächst den Jahren von 1.—5. das Alter vom 5.—10. Jahre am

meisten gefährdet, dann das Alter unter einem Jahre, endlich das Alter über 20 Jahren, welches verhältnissmässig nur selten vom Croup befallen wird, — dessen Disposition für leichtere Halsübel man jedoch nicht leugnen kann.

§. 7. Contagiosität

Die Contagiosität des epidemischen Croups glaube ich mit einiger Sicherheit beobachtet zu haben, und stimme ich sowohl für das direkte Contagium, das ja in neuester Zeit durch ein schreckliches Beispiel in Heidelberg wieder bestätigt worden, als für das Contagium gleichsam *par distance*, wie es Jaffé nennt.

Das direkte Contagium glaube ich mit Bestimmtheit durch folgende Beispiele beweisen zu können.

Die Familie E. hatte 4 Kinder. Der älteste Sohn H. von 8 Jahren, erkrankte an croupöser Rachenentzündung ohne dass gleich vornherein ärztliche Hilfe requirirt wurde. Die beiden anderen kleineren Geschwister des H. spielten mit demselben, genossen aus denselben Gefässen Milch und dgl., wie ich bestimmt nachher erfuhr, und so währte es nur einige Tage, bis die kleine 3½jährige Schwester des H., R. ebenfalls erkrankte. Als ich die Kinder zum erstenmal besuchte, verbot ich jede nähere Berührung der Kinder, und ordnete an, dass jedes von ihnen seine eigene Tasse, Löffel und dgl. haben müsste. Doch schien die Vorsicht zu spät eingeführt worden zu sein; denn auch das dritte Kind, ein Knabe von etwa 5 Jahren, wurde von der Krankheit befallen. Fast zu derselben Zeit kamen in

demselben Hause — obwohl in verschiedenen Familien — 4 leichtere Erkrankungen nach einander vor, wobei ich leider die Bemerkung machen musste, dass (bei diesen leichteren Fällen) trotz des Verbotes die Kinder hinausgelassen wurden und auf dem gemeinschaftlichen Hofe mit den anderen sich tummelten.

Ein sechsjähriges Mädchen, L. v. K. von dem ich schon oben sprach, erkrankte an leichtem Rachencroup, welcher bald der sorgfältigen Behandlung des H. Dr. Schirmer wich. Etwa 14 Tage darauf erkrankte mit leichten Halsbeschwerden der 3 $\frac{1}{2}$ jährige Bruder des Mädchens, und machte eine der schwersten Formen des Rachen- und Kehlkopf-Croup durch.

Ein anderer Fall spricht mir auch deutlich für das Contagium. — Die Verwandte eines von Pharynx und Larynx-Croup befallenen Kindes, besuchte dieses, wie ich durch Nachfragen erfuhr, und einige Tage drauf erkrankte ihr eigenes, kaum ein Jahr altes Kind an derselben Krankheit. Sollte dies nicht ein deutlicher Beweis von direkter Contagiosität sein? —

Ausser diesen, selbst beobachteten Fällen bin ich in den poliklinischen Jahrbüchern öfter auf Geschwister gestossen, welche entweder zu derselben Zeit oder bald nacheinander erkrankten. Ein schreckliches Beispiel hiervon erlebten wir in der diesjährigen Epidemie. Von vier Kindern der Familie G. erkrankten zwei an Diphtherie, und starben. Acht Tage drauf erfolgte die Erkrankung der beiden übriggebliebenen, bis dahin gesunden Geschwister, und auch sie gingen nach nur 12—24 Stunden zu Grunde.

§. 8. Mortalität.

Es ist bekannt, dass das Mortalitätsverhältniss in Bezug auf unsere Krankheit an der Ostseeküste. bedeutend ist, obgleich es nicht die erschreckende Höhe erreicht, welche uns aus Frankreich von einigen Epidemien berichtet wird. Auch hier will ich der speciellen Betrachtung die amtlichen Berichte über das Mortalitätsverhältniss in den Jahren 1862, 63 und 64 vorausschicken.

Tab. X.
Gesamtsterbefälle.

Jahr.	K i n d e r								Er- wachsene	
	unter 1—1 Jahr		1—5 Jahr.		5—10 Jahre.		10—20 Jahre.			
	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.
1862	159	36	136	112	54	34	35	34	306	298
1863	203	160	91	93	48	41	28	29	243	346
1864	203	156	108	100	44	53	32	31	345	344
Summe.	565	452	335	305	146	128	95	94	994	988

Tab. XI.
Todesfälle durch Croup.

Jahr.	K i n d e r.								Er- wachsene	
	unter 1 Jahr		1—5 Jahre.		5.—10 Jahre.		10—20 Jahre.		männl.	weibl.
	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.		
1862	1	0	4	0	0	0	0	0	0	0
1863	1	0	7	3	2	1	0	0	0	0
1864	2	4	9	6	3	5	1	1	0	0
1865	0	0	1	5	0	3	2	2	1	0
1866	0	1	10	5	2	4	0	1	0	0
1867	1	0	7	10	3	2	0	0	2	0
Summa.	5	5	38	29	10	15	3	4	3	0

Aus Tab. X, welche das amtliche Verzeichniss aller in den drei genannten Jahren vorgekommenen Todesfälle enthält, ersehen wir ein Vierfaches:

a) Zunächst, was auch schon aus anderen Forschungen bekannt ist; die grössere Sterblichkeit unter den Kindern im Allgemeinen. Auf die Zahl von 2130 Todesfällen an Kindern bis zum 20. Lebensjahre kommt nur die Zahl von 1982 Erwachsenen, was ein bei weitem kleineres Verhältniss bietet, wenn wir, wie oben bereits berechnet, erwägen, dass die Gesamtzahl der Erwachsenen Ew. die der Kinder um 5017 übertrifft.

b) Unter dem Sterblichkeitsverhältniss nimmt das der Kinder unter dem ersten Jahre unzweifelhaft den ersten Platz ein. Auf 2120 Sterbefälle von Kindern (bis zum 20. Jahr) kommen 1017 von Kindern unter dem ersten Jahre, also fast die Hälfte.

c) Das männliche Geschlecht sehen wir mehr decimirt, indem auf 4102 Gesamtsterbefälle 2,135 vom männlichen, 1967 vom weiblichen Geschlecht vorkommen.

d) Endlich bietet uns die Tab. X davon Einsicht, dass von diesen drei Jahren das J. 1864 die meisten Todesfälle zählt, was auch unsere, oben ausgesprochene Ansicht über die Epidemie desselben Jahres bestätigt.

Sab. XI bestätigt dieses letztere Resultat auch für das J. 1867, indem sie zeigt, dass die Jahre 64 und 67 die meisten Todesfälle in Folge von Croup aufzuweisen haben, und zwar das erstere 31, das andere schon in 9 Monaten 25 Fälle.

Anders verhält es sich hier mit dem zweiten, oben gezogenen Schlusse.

Die Sterblichkeit durch Croup ist bei Kindern unter einem Jahre bei weitem nicht so gross, als es die Gesammtfälle in Tab. X zeigen, es erweist sich dagegen die grösste Sterblichkeit vom 1. bis zum 5., dann von 5.—10. Jahre, und erst die dritte Stelle nimmt das Säuglingsalter bis zum ersten Jahre ein. So fanden wir also: 67 Todesfälle bei Kindern von 1—5 Jahren, 25 bei Kindern 5 bis 10 J., 10 Fälle bei Kindern unter dem ersten Jahre, 7 bei Kindern von 10—20 Jahren, endlich 3 von 5—10 J., endlich 3 bei Erwachsenen, und zwar männlichen Geschlechts.

Die grösste Sterblichkeit an Croup ist hier im Durchschnitt beim männlichen Geschlecht. Die Gesammtzahl der an Cr. gestorbenen Individuen männlichen Geschlechts beträgt 59, während die weiblichen Geschlechts sich nur auf 53 beläuft.

Während der beiden Epidemien bleibt sich das Sterblichkeitsverhältniss ziemlich gleich. Das Jahr 1864 zählt unter den 31 Todesfällen (an Croup) 15 vom männlichen, 16 vom weiblichen, das J. 1867 dagegen 13 vom männlichen, 12 vom weiblichen Geschlecht, was auch die oben (§ 6) dargethanen Resultate bestätigen, dass das J. 64 mehr Erkrankungs- und Todesfälle im weiblichen Geschlecht hatte, obgleich die Anzahl der Croupfälle sich das Gleichgewicht hielten, die Epidemie des J. 67 dagegen mehr dem männlichen Geschlecht verderblich war.

9. Allgemeiner Charakter der diesjährigen Epidemie.

Es wird von einigen Epidemiologen berichtet, dass die Epidemien oft nach warmen Jahreszeiten wieder mit erneuter Kraft aufzutreten pflegen, und dann einen

mehr typhoiden Charakter annehmen. — Auch ich habe dies in der diesjährigen Epidemie erfahren.

Ich glaube ihren Anfang im Monat März annehmen zu können. In dieser Zeit nämlich hört die Scarlatina allmählig auf und es zeigen sich, nachdem im Monat Februar nur ein Fall von croupöser Laryngitis vorgekommen war, plötzlich 6 Fälle von croupöser Pharyngitis und Laryngitis, welche im Monat Mai die Zahl 13 erreichen, nachher aber im Juni fast ganz verschwinden. Der Juli hat indessen wieder einige Fälle, welche bis zum September wiederum zunehmend, einen bösartigeren Charakter annehmen, als ihn die erste Akme im Monat Mai geboten hat. — Der Einfluss der Temperatur, Feuchtigkeit und Windrichtung war ganz ersichtlich von Einfluss auf unsere Epidemie, wie dies bereits im § 2. durch Tab. III, IV und V erwiesen worden ist.

§ 10. Dauer — Incubation.

Ueber das Incubationstadium des epidemischen Croups habe ich nicht genau Forschungen anstellen können. Aus den oben unter Contagiosität (S. 45. § 7) angeführten Fällen, wo nach 14 Tagen etwa der Bruder des 6jährigen Mädchens L. v. K. an bösartigem Croup mit Bronchitis erkrankte, ferner den beiden daselbst erwähnten Geschwistern der Familie G., welche etwa 8 Tage nach dem Tode ihrer beiden vorangegangenen Geschwister erkrankten und starben, kann ich noch kein bestimmtes Resultat in Bezug auf Incubationszeit ziehen.

Ueber die Dauer der Croupfälle, sowohl der mit tödlichem Ausgange, als der Genesungsfälle habe ich folgende Tab. (XII) aufgestellt:

Tab. XII. *)

Jahr.	bis 12 Stun- den.	12—24 Stun- den	24—48 Stun- den.	2—3 Tage.	3—4 Tage.	4—5 Tage.	5—8 Tage.	8—10 Tage.	10—14 Tage.	2—2 ¹ ₂ Wochen	2 ¹ ₂ —3 Wochen	3—6 Wochen
1862	0	3+	1+	0	0	2+	0	0	0	0	0	0
1863	1+	0	2+	2+	0	2+	3+	1 ⁰	1+	1 ⁰	1 ⁰	3 ⁰
1864	0	2+	4+	7+	5+	3 ² +	8 ⁸ +	4 ¹ +	3 ¹ +	1 ⁰	2 ¹ +	4 ¹ +
1865	1+	1+	4+	1+	2+	2+	2 ³	3 ² +	1 ⁰	0	1+	0
1866	2+	5+	2+	9+	3+	0	3 ² +	1+	2 ⁰	0	3 ¹ +	3 ³
1867	3+	5+	6+	3+	4 ³ +	2 ¹ +	4 ¹ +	3 ² +	4 ¹ +	2 ⁰	2 ⁰	2 ⁰
Summa.	7+	16+	19+	22+	14+	11— ²	20— ⁸	12— ⁶	113+	4 ⁰	93+	121+

*) Anmerkung: Die Anzahl der Todesfälle habe ich als Potenzzahl mit einem Kreuze beigestellt. Wo

Der Durchschnitt der 6 Jahre ergibt drei Zeiten als die gewöhnlichste Dauer der croupösen Erkrankungen. Es sind die Zeiträume vom 2.—3., vom 5.—8. (hauptsächlich aber zum 6.) Tage, endlich die längste Zeitdauer, welche 3 Wochen übersteigt. Dasselbe Verhältniss bietet auch die Epidemie des J. 1864, während in der diesjährigen Epidemie die 24—48 Stunden dauernden Fälle zahlreicher sind. In Bezug auf den Ausgang sehen wir, dass keiner von den Fällen bis zum 3. Tage (incl.) glücklich verlaufen wäre. Von den Fällen, welche 8 Tage überdauert haben ist die Hälfte in Genesung übergegangen, und der Tod nach 2—3 Wochen nur noch bei Ausnahmefällen eingetreten.

Die beiden Epidemien von 64 und 67 unterscheiden sich auch noch in Bezug auf die Dauer der einzelnen Fälle. So sehen wir im J. 1864 die Fälle meist 3—4 und 8—10 Tage dauern, und keinen Fall vorkommen, der innerhalb weniger Stunden verlaufen wäre. In der diesjährigen Epidemie dagegen sehen wir fast die Hälfte der Fälle in den ersten 3 Tagen mit dem Tode enden, und verhältnissmässig wenige Fälle nach 8 Tagen dem exitus letalis anheimfallen.

Aus diesen Betrachtungen müsste nothwendigerweise der Schluss folgen, dass die diesjährige Epidemie einen bei weitem bösartigeren Charakter im Allgemeinen dargeboten hat, als die vom Jahre 64, worüber nähere Angaben mir leider fehlen, indem Herr Prof. Mosler erst gegen Ende d. J. 64 hierher berufen ist.

Dass jedoch meine Tab. XII bei aller Genauigkeit auch ungenaue Angaben fassen müsse, weiss ich aus

Erfahrung, indem theils die Eltern der kleinen Patienten sich auf den eigentlichen Anfang der Krankheit nicht entsinnen können, oder denselben übersehen haben, theils haben sie ärztliche Hilfe erst dann requirirt, wenn schon die Noth am grössten war, und dann wird natürlich — wie auch kaum anders möglich, — von dem betreffenden poliklinischen Arzte der Patient mit dem Anmeldungsdatum eingetragen, und bei der Abmeldung von den betreffenden Praktikanten auch oft das Datum nicht so genau genommen. — Aus diesem Grunde darf ich weder mir noch der Wissenschaft verschweigen, dass die gefundenen Angaben der Tab. XII nicht als ganz sichere festzuhalten sind.

§. 11. Allgemeine Symptome.

Bei allen von mir beobachteten Fällen von Rachen- und Kehlkopf-Croup dieses Jahres, so wie bei allen mir mitgetheilten Berichten habe ich einen mehr oder weniger fiberhaften Zustand wahrgenommen, ferner eine fast constante Anschwellung der Hals- oder Submaxillar-Drüsen, und einen Belag auf Gaumen, Tonsillen oder Rachen, oder doch eine gewisse Röthung und Schwellung der genannten Theile. Allerdings gab es Fälle unter den mir mitgetheilten, wo so zu sagen von einem reinem Croup gesprochen wird ohne Betheiligung des Pharynx, doch glaube ich hier der Ansicht Lewin's eitreten zu können: dass bei der epidemischen Verbreitung dieser Krankheit nur durch genaues, tägliches Inspiciren der Gesunden die Anfänge der Krankheit beob-

achtet werden, nur dadurch ihnen vorgebeugt werden könne.

So konnte ich bei einigen von den Croupfällen, welche erst in diesem Stadium zur Behandlung kamen, durch genaueres Ausfragen erfahren, dass die betreffenden Patienten vordem an leichten Halsbeschwerden und leichtem Husteln gelitten haben.

Im Allgemeinen boten sämmtliche Fälle die eben erwähnten Symptome dar, im Speciellen konnte ich jedoch 4 verschiedene Charaktere oder, wenn man sie so nennen darf, Formen bei unser Epidemie unterscheiden.

1. Die erste Form der Krankheit war die leichteste. Die Patienten fühlten sich kaum unwohl, ihr Appetit war sonst gut, der Puls sehr wenig oder fast gar nicht beschleunigt, in seltenen Fällen ein leises Frösteln vorhergegangen, Schlingbeschwerden fast gar nicht bemerkbar, so dass man durch Nichts als das epidemische Auftreten der Krankheit sich bewogen fühlte Gaumen und Schlund zu inspiciren, und da erst wurde man über den eigentlichen Grund des unbedeutenden Unwohlseins belehrt. Ich fand dann in den meisten Fällen auf beiden oder der rechten Tonsille einen weisslichen Belag, der oft membranartig einen Theil derselben bedeckte, und sich leicht mit dem Finger oder Pinsel abstreifen liess; oft fehlte dieser Belag ganz und man fand statt dessen an der hinteren Rachenwand einen weisslichen Schimmer, der bei gutem Lichte wie eine Schleimschicht glänzte, oder endlich fand man nur eine geringe Röthung und Schwellung der Theile. Die Beschwerden fehlten

labei oft, wie gesagt, ganz, und viermal entdeckte ich den beschriebenen Belag bei Kindern, die ich aus Vor- sicht fast täglich untersuchte, da in derselben Familie und demselben Hause einige Fälle von Croup vorge- kommen waren, -- ohne dass die Patienten zuvor auch nur die geringsten Beschwerden geäußert hätten. Nicht nur Kinder, sondern auch Erwachsene welche mit der Wartung Croupkranker beschäftigt waren, sah ich von einer solchen Angina befallen werden, ohne dass jedoch der Prozess, selbst bei expectativer Behandlung, weiter in sich gegriffen hätte.

2. Die zweite Form der Krankheit sprach sich darin aus, dass eine croupöse Entzündung am Gaumen und Rachen nicht zu entdecken war — zu der Zeit als ärztliche Hilfe in Anspruch genommen wurde, — wohl aber alle Symptome die croupöse Entzündung des Larynx verriethen. Und solcher Fälle wurde der grösste Theil beobachtet. Sie verliefen meist tödlich in einem Zeitraum von 48 St. bis zum 6. Tage. Puls war dann auf 130—150 Schläge, Athemfrequenz auf 20—60 (in Min.) vermehrt, die übrigen Symptome die des ausgesprochenen Croups. In einigen Fällen trat spontanes Erbrechen ein, die Respiration wurde immer mehr erschwert, und der Tod erfolgte nach Eintritt eines soporösen Zustandes durch Kohlensäureintoxication, indem eine livide Gesichtsfarbe und eine stets vermehrte Kälte sich über Gesicht und den gesammten Körper allmählig verbreitete. In diesen Fällen war das Bewusstsein fast geschwunden, die kleinen Patienten wurden gegen ihr Ende apathisch und nahmen gar keine Nahrung mehr

an. — Nur in einem solchen Falle hatte ich die Freude einen kleinen Patienten aus diesem soporösen Zustande noch zum Leben zurückgerufen zu sehen. Es war dies an einem kräftigen kleinen 3½jährigen Knaben aus der Privatpraxis des Herrn Dr. Schirmer, welcher diesen gefährlichen Fall in Gemeinschaft mit Herrn Prof. Bardeleben behandelte; beide Herren gestatteten mir gern Beobachtungen daran zu machen, welche mir um so leichter wurden, da ich das Kind und seine Natur, als Freund des Hauses zuvor genau gekannt habe.

Nachdem der kleine Patient unter den Erscheinungen des reinen Croups an stets wachsender Athemnoth gelitten, nachdem die Respiration 40 und der Puls 160 erreicht, nachdem die Anstrengung sämtliche Inspirationsmuskeln beinahe bis zum Erschlaffen ausgedehnt hatte und das Kind während der angstvollen Augenblicke nirgends Ruhe fand, und meist auf der Mutter Schoos verweilte, nachdem endlich die stärksten Dosen von Emeticis (Cupr. sulph. scrj: Uncj und später tart. stib. gr. ½ halbstündl.) völlig zwecklos eingegeben, und der soporöse Zustand sich des Kleinen zu bemächtigen schien, erfolgte plötzlich eine Expectoratio, welche in dem Befinden eine Umwandlung hervorgerufen zu haben schien; und von da besserte sich das Befinden des Kleinen sichtlich, indem nur noch die mitafficirten Brustorgane Bedenken einzuflößen im Stande waren.

3. Dieser zweiten, mehr rein croupösen Form kann ich eine dritte zur Seite stellen, welche gleichsam den Uebergang zur eigentlichen Diphtherie darzubieten

scheint. Es war in diesen Fällen die Rachenaffection eine bedeutendere, in den Vordergrund tretende. In zweien dieser Fälle erfolgte der Tod schon innerhalb 6—12 Stunden à dato der ersten Behandlung. Diese Form hatte zwar auch alle Eigenschaften des echten Croups, aber noch ehe der Larynx ergriffen wurde, konnte ich wenigstens in einem dieser Fälle mit gänzlicher Sicherheit eine bedeutende Affection des Pharynx constatiren. — Kopfweh, Uebelkeiten und Erbrechen pflegten voranzugehen, die Schwellung der Hals- und Submaxillar-Drüsen war in diesen Fällen sehr bedeutend, im Munde starker Katarrh, die Tonsillen, Gaumen und Rachen theils mit blutigen Borken, theils mit übelriechendem membranartigem Secret bedeckt, das Schlucken beschwerlich, das Allgemeinbefinden sehr verschlechtert, Pulsfrequenz und Temperatur erhöht, dagegen die Athemfrequenz geringer als bei der zweiten Form. Die Patienten lagen kraftlos, wiewohl durchaus nicht ohne alle Theilnahme da, meist mit vornüber gebeugtem Kopf, um den reichlichen Speichelfluss besser zu befördern. Entweder endeten solche Fälle in 6—48 Stunden und dann trat der Tod ein — zwar nicht durch Suffocation, wie ich überzeugt bin —, sondern plötzlich auf eine mir unerklärliche Weise, oder sie dauerten 4—8 Tage, und dann erfolgte der Tod, meiner Ansicht nach durch Kräfteconsumption bei völligem und klarem Bewusstsein.

Ich werde die an einem solchem Falle gemachten Beobachtungen genauer mittheilen, indem die wenigen andern ihm ähnlichen Fälle fast dieselben Erscheinungen mit ihm gemein haben.

Ein Knabe von 7½ Jahren, von schwächlicher Constitution, erkrankte an einem leichten Husteln, welches fast 14 Tage anhielt. Da sich Schlingbeschwerden dabei einstellten, die Halsdrüsen angeschwollen waren und der Husten verändert schien, suchten die Eltern ärztliche Hilfe. Als ich den Patienten zuerst untersuchte, fand ich die Tonsillen stark geschwollen, geröthet, mit Plaques bedeckt, welche eine graugelbe Farbe hatten und nach deren Entfernung theils sehr starke Vascularisation der Schleimhaut sichtbar wurde, theils die Schleimhaut der Tonsillen und des weichen Gaumens wie eine blutige Wunde aussah. Schlingbeschwerden waren nicht bedeutend, obwohl die ominöse Hals- und Maxillardrüsenanschwellung stark in die Augen trat; der Appetit war wenig geringer trotz des eine drohende Höhe erreichenden Fiebers und Temperaturerhöhung. Das Athmen schien sogar nur um wenig erhöht. Es wurde wegen des hohen Fiebers eine roborirende und zugleich örtliche Behandlung angewandt, um die örtliche Ausbreitung des Processes zu verhindern. Patient bekam liq. fer. sesquichlor (dr j: dr jj:) dreistündlich 7 Tropfen und wurde mit einer Lösung von acid. chromic. (scrj: drjjj) dreimal täglich gepinselt und einige Male graue Quecksilbersalbe in die Gegend des Halses eingerieben. Doch die sorgfältigste Behandlung und Aufmerksamkeit konnten den fortschreitenden Process nicht aufhalten. Spontanes Erbrechen trat mehrmals des Tages auf, jedoch ohne dem Kinde Erleichterung zu verschaffen. Auch die Pinselung schien ganz erfolglos, indem die zähen,

un schwarzgrauen Membranen sich immer wieder regenerirten. Der Larynx war jetzt (am 4 Tage) ganz von dem Prozess eingenommen; das verrieth das sägende Athemgeräusch, die heisere bellende Stimme, endlich die angestrengte Respiration. Die Erscheinungen von Seiten des Larynx nahmen vom 4 Tage nicht mehr zu, eher wurden sie geringer. Auch seitens der Lunge konnte ausser dem Trachealrasseln nichts nachgewiesen werden. Doch befand sich der Patient von Stunde zu Stunde schlechter, der gesammte Organismus begann sich an der Krankheit zu betheiligen. Es trat ein Abfall der Kräfte ein; dabei verhinderten die brennenden Schmerzen des wunden Pharynx die Annahme jeglicher Nahrung; auch kühlendes Getränk wurde verschmäht, indem es dem Patienten beim Schlucken Schmerzen verursachte. Bis zum letzten Augenblicke blieb Patient bei völligem Bewusstsein. Der Tod war ein langsames Ausgehen der Kräfte, gleichsam durch Erschöpfung.

Der Ursache des Todes vom anatomischen Standpunkte aus auf den Grund zu kommen war mir leider nicht vergönnt, da die Sektion von den Eltern verweigert wurde. Es bleibt jedoch nach diesem klinischen Krankheitsbilde an nichts weiter zu denken übrig, als an eine langsame Kräfteconsumption oder an eine Intoxication des Blutes durch den diphtheritischen Prozess. Die erstere Annahme scheint mir jedoch bei diesem Falle die wahrscheinlichere.

Eine vierte Form von Rachencroup, welche eigentlich den Namen reine Diphtherie (nach Trousseau Di-

phtheritis maligna) verdienen könnte, ist während den diesjährigen Epidemie ebenfalls hier von Herrn Dr. Vogt beobachtet worden und hat derselbe mir darüber folgendes mitgetheilt.

Ein junger, nicht gerade kräftiger Mann von etwa 28 Jahren, Predigtamtskandidat, erkrankte an leichten Halsbeschwerden, welche ihn jedoch nicht hinderten noch einer neuen Anstrengung und Erkältung in der Kirche durch Predigen sich auszusetzen. Zwei Tage nach dieser Schädlichkeit, der er sich ausgesetzt, suchte er bei immer zunehmender Verschlimmerung seines Uebels ärztliche Hilfe. Herr Dr. Vogt, welcher ihn am 27. August zuerst untersuchte, fand folgendes:

Eine brennend heisse Haut, bedeutendes Fieber (140 Pulsschl.), den Puls klein, hart, die Hals- und Submaxillardrüsen stark geschwollen, das Schlucken behindert, schmerzhaft, die Sprache jedoch noch ganz frei. Die Inspektion ergab auf der linken Tonsille und Gaumenbogen einen festhaftenden diphtheritischen Belag. Es wurde mit arg. nitr. in Substanz touchirt, Gurgelwasser von kali chlor. verschrieben und eine roborirende Diät verordnet.

Am folgenden Tage war Patient sehr aufgereggt; der fieberhafte Zustand blieb derselbe, während der Belag weiter um sich gegriffen hat auf dem harten Gaumen sowohl einerseits, als auf dem Rachen andererseits. Ueber Nacht schwitzte Patient viel, wurde sehr schwach; das Fieber behielt den folgenden Tag (29. Aug.) eine bedeutende Höhe. Die Membranen lösten sich zum Theil in Fetzen beim Touchiren, waren miss-

arbig und übelriechend. Des Mittags trat in diesen Tagen Remission, des Abends Exacerbation ein.

Am 30. August Morgens war der Zustand ein verschlimmter, das Fieber hoch, Puls zwischen 140—150, Stimme etwas heiser, das Athmen sehr behindert. Bei der Inspektion bemerkte man an dem linken Gaumengogen bis zur Epiglottis herab eine pralle Geschwulst, welche die Athem- und Schlingbeschwerden vermehrte. Es wurde Mittags die Punktion der Geschwulst gemacht und blutig seröse Flüssigkeit daraus entleert. Darauf folgte in dem Athmen sichtliche Erleichterung, doch besserte sich dadurch das Allgemeinbefinden des Patienten in Nichts.

Am 31. August waren die Lokalbeschwerden noch geringer, Fieber blieb jedoch bedeutend. Der missfarbige Belag war nunmehr ganz genau begrenzt. Es war davon eingenommen: der linke vordere Gaumengogen bis über die Grenze des harten Gaumens, die Medianlinie etwas überragend; auch die Uvula war ganz davon umgeben. Unter der festadhärirenden Membran konnte man beim Fortnehmen derselben die glatte Schleimhaut sehen. Von Seiten der Brustorgane stellte sich etwas Rasseln und Husten ein.

Am folgenden Morgen (1. Septbr.) war das feuchte Rasseln über die ganze Lunge verbreitet, und es wurde teilweise ein schleimiges Sputum entleert. Die Athemnoth war beträchtlicher, wurde jedoch durch stärkeres Husten und Expectoration etwas gemindert.

Der Zustand des Kranken wird immer bedenklicher. Gegen Mittag ist der Puls sehr klein, fadenförmig, da-

bei sehr frequent und unregelmässig; das Fieber bedeutend, das Athmen krampfhaft, von Trachealrasseln begleitet, der Collapsus zunehmend. Nachmittags um 3 1/2 Uhr erfolgte unter krampfhafter Respiration plötzlich der Tod.

Herr Dr. Vogt beobachtete noch an zweien seiner Patienten, ebenfalls Männern von 31 und 28 Jahren einen ähnlichen diphtheritischen Belag auf Gaumen, Tonsillen und Rachen; doch ging der Process bei beiden nicht weiter; der eine von ihnen hatte sogar trotz des bedeutenden Umfangs des Belages nur ganz geringes Fieber und waren an ihm kaum Störungen des Allgemeinbefindens wahrzunehmen.

In diesen Fällen, namentlich in dem umfangreich eben beschriebenen haben wir es also mit einer bösartigen typhoiden Allgemeinerkrankung zu thun, welche von dem lokalen diphtheritischen Halsübel ausgehend durch das bedeutende Fieber den Organismus in Kurzem aufzureiben im Stande ist.

In allen vier in dieser Epidemie beobachteten Formen dieser Krankheit habe ich leider kein Symptom finden können, welches mich prognostisch hätte leiten können. Albuminurie, welche von vielen Beobachtern für sehr wichtig in ihrer Beziehung gehalten wird, habe ich bei den allerdings nur wenigen Fällen, die ich darauf untersucht, nicht finden können. Schlaf, der bei andern Kinderkrankheiten oft prognostisch wichtig ist, hat mich nicht leiten können, denn ich habe einen anscheinend ruhigen, ich möchte sagen, gesunden Schlaf beobachtet bei Kindern, die doch in den nächsten 24—28 Stunden dem Tode anheimfallen mussten. Appetit fand

h eigenthümlicherweise bei allen meinen kleinen Patienten recht erhalten; einige sogar forderten sich kurz vor dem Tode noch zu essen und zu trinken; so auch der oben erwähnte junge Mann von 28 Jahren. Auch die Niedergeschlagenheit habe ich nicht als diagnostisches Merkmal verwerthen können, indem die kleinen Patienten selbst in der Zeit zwischen den starken Athembeschwerden spielten und munter und heiter erschienen.

Das einzige Merkmal, welches jedoch mehr für die croupöse Form passte, war die Somnolenz. So wie die Kinder schlaff und theilnahmslos waren, so wie das Gesicht cyanotisch war und die Augen ihren Ausdruck verloren, konnten wir einigermaßen mit Bestimmtheit einen bösen Ausgang vorhersagen; doch sah ich auch davon eine Ausnahme, während in den Fällen von rapidem Rachen- und Kehlkopfscroup der Tod plötzlich und schleichend bei völligem Bewusstsein einzutreten legte.

Das wichtigste diagnostische Merkmal blieb immer die Betheiligung der Brustorgane an dem croupösen Prozesse. Doch von diesem Punkte fand ich zu viele Ausnahmen, indem in einzelnen Fällen gar keine Theilnahme der Brustorgane stattfand, in anderen nichts weiter als auscultatorisch ein Trachealrasseln vorhanden war, während in zwei von mir beobachteten Fällen eine ausgesprochener Bronchitis dennoch Genesung ergabte.

Ich bedaure nur, über die Athemfrequenz, welche in seiner werthvollen Arbeit, die ich mir in ge-

wisser Hinsicht zum Muster genommen, als wichtiges diagnostisches Merkmal hervorhebt, kenne genaueren Untersuchungen angestellt zu haben.

§. 12. Complicationen und Nachkrankheiten.

Während der diesjährigen Epidemie fand ich nur einen Fall von Croup complicirt mit Scarlatina, mehre der tödtlichen Fälle dagegen complicirt mit Bronchitis capillaris.

Von Nachkrankheiten habe ich nur chronischen Laryngealkatarrh beobachtet und zwar nur an zweien meiner früheren Patienten, während ich Lähmung der Schlingwerkzeuge, wie sie von verschiedenen Epidemiologen namentlich in Frankreich beschrieben worden, nicht in einem der beobachteten Fälle weder als Complication noch als Nachkrankheit habe constatiren können.

§. 13. Behandlung.

Durch die Erfolglosigkeit der Behandlung unserer Croupfälle finde ich die Angaben, welche Herr Prof. Mosler in seinen klinischen Vorträgen öfter gemacht, bestätigt, nämlich: dass er, was Häufigkeit und Intensität der croupösen Prozesse, sowie die dadurch bedingte Erfolglosigkeit der Mittel anlangt, in Greifswald noch viel ungünstigere Resultate erhalten habe, als in den Gegenden von Mitteldeutschland (Giessen), wo er früher

Beobachtungen darüber gesammelt hat. In der hiesigen Poliklinik sind von Herrn Prof. Mosler schon alle gegen Croup empfohlenen Mittel versucht worden, ohne dass derselbe im Stande wäre eines derselben besonders zu empfehlen. Einige Male hatte es den Anschein, als ob eine sehr energische Quecksilberbehandlung, wobei dieses heroische Mittel gleichzeitig innerlich und äusserlich in den kürzesten Zwischenräumen angewandt wurde, die Genesung begünstigte. Anderemale waren es energische Beitzmittel, welche in Verbindung mit der innerlichen Darreichung von kleinen Gaben Calomel, und zeitweilig gereichten Brechmitteln gleichfalls gute Wirkung gethan. Doch sind diese Beobachtungen zu vereinzelt, als dass daraus gewagt werden dürfte, bestimmte Schlüsse zu ziehen.

Auf den Rath Herren Prof. Mosler's habe auch ich in der hiesigen Poliklinik verschiedene Mittel versucht, bedauerte indess dabei ganz besonders, dass unsere allseitigen Versuche die frühzeitige Tracheotomie, welche Herr Bartels mit vielem Rechte empfiehlt, öfter auszuführen an dem grossen Widerstand von Seiten der Angehörigen der Patienten — wie noch weiter unten erörtert werden soll — gescheitert ist, indem frühere Fälle von Tracheotomie bei Croup, weil die Operation in der Regel zu spät erst zugelassen wurde, hier nicht den gewünschten Erfolg gehabt haben.

In Folgendem gebe ich eine kurze Mittheilung dessen, wass ich selbst über die Behandlung des Croup hier erfahren habe.

In der unter 1 beschriebenen leichtesten Form wurde ein leichtes Gurgelwasser aus kali choricum (Drch. jj - jjj: Unc vj - vjjj) oder kali hypermanganicum (scr j-jj: Unc X-Xjj), oder Decoct Salviae oder stark gesalzenen Speisen verordnet. In Familien, wo andere Kinder an Rachen- und Kehlkopfscroup erkrankt waren, touchirte ich ohne weiteres bei dem geringsten Belag auf den Tonsillen oder im Rachen mit einer X bis XV gränigen Lösung von arg. nitr. die betreffenden Theile, und ich glaube mit nicht ganz unbedeutendem Erfolge.

Bei der zweiten und dritten Form wurde öfters ein Brechmittel gereicht, ausserdem warme Umschläge auf Hals und Nacken oder umgekehrt Eisumschläge auf die genannten Theile mit gleichem Erfolg angewandt, ausserdem bei einigen der Patienten stündlich $\frac{1}{6}$ gr. Calomel gereicht.

Offen gestanden sah ich von keiner dieser Behandlungsweisen einen sichtlichen Erfolg. Am meisten sah ich noch Erleichterung in dem Stadium der Somnolenz von warmen Bädern mit kalten Uebergiessungen, welche den von Athemnoth sehr gequälten Patienten eine bedeutende Erleichterung verschafften.

Bei intensiven Fällen der dritten Form wurde Einreibung von Quecksilbersalbe gemacht, jedoch nicht bis zur Salivation fortgesetzt. Blutegel und Aderlass wurden ganz vermieden. Bei exquisiten Formen der dritten Art (wie z. B. bei dem S. 58 seqq.) wurde eine roborirende Diät verordnet und als Getränk nur gesalzne Flüssigkeit als: Bouillon und kohlensaure Was-

ser gestattet, dabei innerlich noch liq. ferri sesquichlor (dr j: dr jj) dreistündlich 10 Tropfen gereicht, während die vom Belag bedeckten Theile des Gaumens und Rachens dreimal täglich touchirt wurden etwa mit einer starken Lösung von arg. nitr. (X: XV gr.: Uncj) oder mit einer Lösung von acid. chromic. (scr j-dr $\frac{1}{2}$: dr jjj-unc $\frac{1}{2}$).

Die Tracheotomie wurde in zwei Fällen der dritten Form von Herrn Dr. Schirmer gemacht und mir darüber folgendes mitgetheilt.

Ein kräftiger Knabe von 7 Jahren erkrankte an einem durch 14 Tage zu einer sichtbaren Höhe sich steigenden Croup, ohne (zur Zeit der eintretenden Behandlung) sichtbare Belege im Rachen, und bei freien feineren Bronchien. Die nach 14 Tagen seit Beginne der Krankheit plötzlich auftretende Dyspnoë bewog die Eltern nach vielem Ueberredenden, die Tracheotomie zu gestatten. Dieselbe wurde Nachts vorgenommen. Der Hautschnitt war erschwert durch ein vor 8 Tagen applicirtes Vesicans, welches eine speckig aussehende wunde Stelle zurückgelassen hatte. Die Operation öffnete den 4. 5, u. 6. Trachealkorper.

Der momentane Erfolg war ein befriedigender. Die Athemnoth war fast ganz beseitigt; es erfolgte ein mehre Stunden anhaltender ruhiger Schlaf, darauf der Genuss grösserer Quantitäten Milch. Doch schon 12 Stunden darauf wurde die Temperatur erhöht, der Puls beschleunigt, das Athmen behindert. Es stellte sich starker Husten stossweise ein; die Dyspnoë wurde stärker, Patient mochte nicht mehr liegen, sass aufrecht,

zeigte grosse Unruhe, welche 24 Stunden nach der Operation mit dem Tode endete.

Die Sektion des Halses ergab: croupöse Affektion des Larynx bis zur Bifurcation der Trachea. Die röhrenartige Membran war leicht herauszuziehen. Diphtheritische oberflächliche Ulcera waren im Kehldeckel und (seitlich) am Larynx an den Seitenwandungen. Auscultation und Percussion hatten kein Ergebniss.

Zwei Tage später wurde in derselben Gegend der Stadt (Rossmühlengasse) an einem 1½ jährigen Mädchen auch wegen Croup die Tracheotomie ausgeführt. Das Kind war cyanotisch und hatte kurz vorher eine heftige Aufregung wegen Dyspnoe durchgemacht. Während der Oeffnung der Trachea wurde die Respiration immer mangelhafter, so dass nach Einlegung der Canule das Kind schlaff dalag und nicht respirirte. Herzschlag war aber noch vorhanden. Nach zweistündigen Wiederbelebungsversuchen, die theils in Aussaugen von blutigem Schleim aus der Trachea, in rythmischer Compression des Thorax, Besprengen mit kaltem Wasser bestanden, respirirte das Kind wieder regelmässig, nahm Nahrung zu sich und spielte. Darauf folgte eine vollständige Euphorie während circa 20 Stunden; darauf jedoch starke Temperaturerhöhung, nicht heftige aber öfter wiederkehrende dyspnotische Anfälle, zunehmender Collapsus; 36 Stunden nach der Operation erfolgte der Tod.

Auch diese Operation war in der Nacht gemacht; die Sektion wurde nicht gestattet. Diphtheritische Be-

lege in den Fauces waren nicht vorhanden, ebenso waren die feinsten Bronchien frei von Exudat.

Diese beiden Fälle ergeben, dass die Tracheotomie als therapeutisches Mittel sichtlich einen augenblicklich guten Erfolg habe. Einen weitem Schluss kann ich leider aus diesen beiden Fällen nicht ziehen.

Trotz der vielen croupösen Erkrankungen dieses Jahres in unser Poliklinik haben wir zu bedauern, dass nicht mehr Erfolge von der Tracheotomie erzielt werden konnten, und mir ausserdem durch Verweigerung der Sektion alle gründlichere pathologisch-anatomische Einsicht in den besprochenen Krankheitsprozess unserer Epidemie versagt worden war. Die Furcht des Proletariats hierselbst vor dem „Sniden“ d. i. der Tracheotomie, ist so gross, dass es bei aller Ueberedungskunst kaum einmal unter hundert gelingt, die Eltern zu bewegen, dass sie die Tracheotomie gestatten; andererseits haben sie eine so grosse Aversion vor dem Seciren ihrer Verstorbenen, dass man oft schlimm fährt, wenn man einen derartigen Vorschlag zu machen wagt.

Lebenslauf.

Leopold Franz Zielke geboren am 5. November 1842 in Kosten im Grossherzogthum Posen, bin der Sohn des Katecheten u. Rectors Ferdinand Zielke u. Vincentine geb. von Szczytowska, katholischer Konfession. Meinen ersten Unterricht erhielt ich im elterlichen Hause. Im Jahre 1850 wurde ich Schüler der Quinta des Gymnasiums zu Poln. Lissa unter dem Direktorate Herrn Dr. Ziegler's, musste jedoch schon nach einjährigem Besuche auf ärztlichen Rath das elterliche Haus wieder beziehen und konnte mich mehre Jahre hindurch fast ausschliesslich nur mit Musik beschäftigen. Erst im Jahre 1856, nachdem ich gehörig vorbereitet worden, wurde ich in die Tertia des St. Marien-Gymnasiums zu Posen unter dem Direktorate Herrn Brettners aufgenommen und erhielt noch von demselben anno 1863 das Zeugniß der Reife.

Zu Michaelis desselben Jahres wurde ich auf der hiesigen Universität unter dem Rektorate Prf. Bardeleben's immatrikulirt und von dem damaligen Dekan Prf. Pernice in das Album der medizinischen Fakultät eingetragen. Hierselbst habe ich mich acht Semester hindurch mit dem medizinischen Studium beschäftigt und bestand am 21. Februar 1866 das tentamen physicum, am 17. August 1867 das examen rigorosum.

Während dieser acht Semester hörte ich:

1. Osteologie, Syndesmologie, Myologie und Splanchnologie, Anatomie der Sinnesorgane, Encyklopaedie und Methodologie der Medizin; Experimentalphysiologie, Physiologie der Sinnesorgane bei Herrn Prof. Dr. Budge,

2. Anatomie des Nerven- und Gefäßsystems; Anatomie des Gehirns und Rückenmarks; Osteologie und Chondrologie; Vergleichende Anatomie bei Herrn Prof. Dr. Schultze.

3. Entwicklungsgeschichte bei Herrn Dr. Landois.

4. Anorganische und organische Chemie; auserlesene Kapitel der Chemie bei Herrn Prof. Dr. Limpricht.

5. Theoretische organische und anorganische Chemie bei Herrn Prof. Dr. Schwanert.

6. Allgemeine Naturgeschichte bei Herrn Dr. Jessen.

7. Allgemeine Experimentalphysik und Repetitorium über physikalische Gegenstände bei Herrn Prof. Dr. v. Feilitzsch.

8. Allgemeine Mineralogie bei Herrn Prof. Dr. Hünefeld.

9. Anthropologie und Psychologie bei Hr. Prof. Dr. George.

10. Allgemeine und spezielle pathologische Anatomie bei Herrn Prof. Dr. Grohé; bei denselben Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane.

11. Theorie der Geburtshilfe, Frauen- und Kinderkrankheiten bei Herrn Prof. Dr. Pernice.

12. Giftlehre, Arzneimittel- und Arzneiverordnungslehre, Brunnen- und Bäderkunde, Verbandlehre bei Herrn Professor Dr. Laurer.

13. Spezielle Pathologie und Therapie; Physikalische Diagnostik; Ueber Nierenkrankheiten; Psychiatrie bei Herrn Prof. Dr. Mosler.

14. Physikalische Diagnostik bei Herrn Dr. Krabler.

15. Allgemeine und spezielle Chirurgie; Ausgewählte Kapitel der Chirurgie; Akiurgie bei Herrn Prof. Dr. Bardeleben.

16. Augenheilkunde; Ueber Augenoperationen; Ueber Refraktions- und Accomodationsstörungen des Auges bei Herrn Dr. Schirmer.

17. Ueber Knochenbrüche und Verrenkungen; Ueber Hautkrankheiten und Syphilis; Demonstrationen der vorkommenden Fälle venerischen- und Hautkrankheiten bei Herrn Dr. Heineke.

18. Ueber medizinische Polizei und gerichtliche Medizin bei Herrn. Dr. Haeckermann.

Ausserdem war ich thätig:

1. Bei den Präparirübungen, dem mikroskopisch-physiologischen Coursus unter Leitung des Herrn. Prof. Dr. Budge.

2. In dem praktischen Coursus der pathologischen Anatomie und Physiologie unter Leitung des Herrn. Prof. Dr. Grohé.

3. In dem chemischen Laboratorium unter Leitung der HH. Proff. Dr. Limpricht und Dr. Schwanert.

4. In der geburtshilfflichen Klinik und Poliklinik unter Leitung des Herrn Prof. Dr. Pernice.

5. In der medizinischen Klinik und Poliklinik unter Leitung des Herrn Prof. Dr. Mosler.

6. In der chirurgischen und augenärztlichen Klinik; in den Operationsübungen unter Leitung des Herrn Prof. Dr. Bardeleben.

7. In den klinischen Uebungen in der Diagnose von Augenkrankheiten; in dem ophthalmoscopischen Coursus unter Leitung des Herrn. Dr. Schirmer.

Bei dieser Gelegenheit kann ich es nicht unterlassen, allen diesen hochverehrten Männern, welche zu meiner Ausbildung beigetragen, den wärmsten Dank auszusprechen.

THESEN.

I.

Die Trepanation des Schädels ist nicht gänzlich zu verwerfen.

II.

Fracturen der Schädelbasis sind nicht immer letal.

III.

Die beste Prophylaxis gegen die Cholera ist: sorgfältige Diät und Einschreiten gegen die ersten Symptome des Darmkatarrhs.

IV.

Das Sekret des epidemischen Croups ist direkt contagiös.

V.

Das Atropin ist bei Entzündungen der Iris ein äusserst schätzbares Mittel.



